Dossier de demande de classement
en **Réserve naturelle régionale**
du site des dunes et paluds bigoudènes

Volet scientifique

Porteurs du projet :

Communauté de communes du haut Pays bigouden et
communauté de communes du Pays bigouden sud

Avec le soutien du Conseil régional de Bretagne

Avec la contribution technique et scientifique de Bretagne Vivante

Rédaction : Sarah Boillot

Relectures :

Aurélie Roussel (CCHPB)

Benjamin Buisson (CCPBS)

Rosine Binard (Conseil régional de Bretagne)

Gaétan Guyot (Bretagne Vivante)

Pierre Devogel (GRETIA)

Elise Laurent (CBNB)

Transmis pour relecture à l'ensemble des membres du comité de pilotage de préfiguration de la RNR des dunes et paluds bigoudènes, le 22/05/2025

Crédits photos : sauf mention contraire - Sarah Boillot, CCPBS et CCHPB

TABLE DES MATIERES

1 - Présentation générale du site	1
1.1 - Situation géographique.....	1
1.2 - Contexte socio-économique	2
1.3 - Contexte administratif.....	3
1.3.1 - Protections existantes sur le territoire.....	3
1.3.2 - Projet de RNR Dunes et paluds bigoudènes.....	8
2 - Connaissances scientifiques	8
2.1 - Contexte environnemental.....	8
2.1.1 - Cadre climatique.....	8
2.1.2 - Cadre Hydrographique	10
2.1.3 - Cadre Géologique.....	12
2.1.4 - Cadre Géomorphologique	14
2.2 - Patrimoine naturel.....	15
2.2.1 - Patrimoine géologique	15
2.2.2 - Habitats	19
2.2.3 - Flore.....	21
2.2.4 - Faune	24
2.3 - Patrimoine archéologique et historique.....	36
3 - Gestion, usages et menaces.....	38
3.1 - Gestion et usages.....	38
3.1.1 - Gestion des espaces naturels	38
3.1.2 - Usages sur le site.....	39
3.2 - Menaces.....	42
3.2.1 - Menaces pour le Patrimoine géologique	42
3.2.2 - Menaces pour le Patrimoine biologique	44
4 - Conservation, protection et valorisation de la future RNR.....	49
4.1 - Enjeux de conservation	50
4.1.1 - Les zones humides	50
4.1.2 - L'éstran et les milieux dunaires.....	51
4.1.3 - Les landes sur serpentine	51
4.1.4 - Les paysages.....	52
4.1.5 - Le patrimoine vernaculaire.....	53
4.1.6 - Le patrimoine archéologique	54
4.2 - Enjeux structurants transversaux	54
4.2.1 - Acquisition de connaissances.....	54
4.2.2 - Sensibilisation du public.....	55
4.2.3 - Stratégie foncière.....	56
4.2.4 - Adaptation au changement climatique	56
4.2.5 - Adéquation entre les objectifs fixés et les moyens alloués	56
4.2.6 - Cohérence entre les politiques publiques et harmonisation des outils de protection ..	57
5 - Conclusion	57
6 - Bibliographie / webographie	58
7 - Annexes.....	60

GLOSSAIRE

APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope

CBNB : Conservatoire botanique national de Brest

CCHPB : Communauté de communes Haut Pays Bigouden

CCPBS : Communauté de communes Pays Bigouden Sud

CELRL ou CdL : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou Conservatoire du littoral

DHFF : Directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Directive Habitats, Faune, Flore »

DO : Directive européenne 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite « Directive Oiseaux »

DOCOB : Document d'objectifs Natura 2000

DPM : Domaine public maritime

INPG : Inventaire national du patrimoine géologique

OUESCO : Syndicat mixte du SAGE Ouest-Cornouaille

RNR : Réserve naturelle régionale

SAGE : Schéma d'aménagement et de gestion des eaux

SIVU : Syndicat intercommunal à vocation unique

1 - Présentation générale du site

1.1 - Situation géographique

Le site des Dunes et paluds bigoudènes constitue la partie méridionale de la baie d'Audierne. Elle est située à l'extrême sud-ouest de la Bretagne, dans le département du Finistère. Elle s'étire en un arc de cercle d'une quarantaine de kilomètres de la Pointe du Raz, au nord, au Cap Caval, au sud.

Figure 1 : Localisation du projet de RNR Dunes et paluds bigoudènes

L'orientation générale de cette baie passe du SSE-NNO dans sa partie sud à quasiment E-O dans sa partie nord (Yoni et Latteux, 2004). Elle peut être scindée en deux entités en fonction du type de substrat rencontré : la côte rocheuse et haute au nord, et la côte sédimentaire et basse au sud.

Le secteur qui fait l'objet du présent rapport est situé sur la partie sud de la baie d'Audierne (cf figure 1), secteur d'accumulation sédimentaire sur une longueur d'une dizaine de kilomètres de côte. Il se situe sur le territoire des Communautés de communes du Pays bigouden sud (CCPBS) et du haut Pays bigouden (CCHPB) et concerne 10 communes (cf figure 2) : Plozévet, Pouldreuzic, Plovan, Peumerit, Tréogat, Plonéour-Lanvern pour le Haut Pays Bigouden et Tréguennec, Saint-Jean-Trolimon, Plomeur et Penmarc'h pour le Pays Bigouden Sud.

Figure 2 : Le périmètre du projet de RNR des dunes et paluds bigoudènes dans son contexte administratif

1.2 - Contexte socio-économique

L'occupation humaine de l'espace est inégale sur ce secteur de la baie d'Audierne. Au sud, les communes présentent un tissu urbain relativement dense et étendu par rapport à celles situées au nord, plus petites, montrant une dissociation forte entre un bourg dense et des hameaux et maisons dispersés sur le reste du territoire communal. L'un des aspects les plus étonnants du site est sans doute la présence d'habitations isolées, comme perdues au milieu de la palud.

L'**activité touristique** constitue l'un des secteurs économiques les plus importants du Pays bigouden. De nombreuses structures d'accueil (campings, hôtels, gîtes) et attractions sont proposées aux touristes. Le site des dunes et paluds bigoudènes est réputé pour la qualité de ses vagues et la beauté de ses paysages dunaires. L'attractivité du littoral bigouden se révèle également au travers du pourcentage de résidences secondaires qui s'élève en moyenne à 22 % contre 11 % pour le département. Le sud du site et, plus modestement, le nord, sont très fréquentés par les touristes. Le pic de fréquentation est situé autour du 15 août chaque année. L'hôtellerie de plein-air constitue l'hébergement le plus utilisé sur le site (65 % des offres pour l'ouest Cornouaille).

L'**agriculture** était, dans les années 1950, l'un des secteurs économiques les plus florissants du Pays bigouden, notamment les cultures maraîchères. Divers facteurs ont abouti à la diminution des surfaces agricoles au profit de friches ou d'extensions urbaines à l'heure actuelle. En ce qui concerne le site des dunes et paluds bigoudènes, l'économie agricole s'est aujourd'hui tournée vers les cultures céréalières, l'élevage et la bulbiculture (culture de bulbes à fleurs). La déprise agricole des années 1980,

accompagnée d'une modification des pratiques, n'est pas sans effet sur la conservation des habitats naturels et des espèces.

L'**industrie de la pêche** a été florissante dans le Pays bigouden et a grandement contribué à son essor économique. A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, cette activité a attiré un nombre croissant d'hommes et de femmes qui ont préféré délaisser l'agriculture pour la pêche et les emplois offerts dans les conserveries qui étaient alors plus lucratifs que le travail du sol. Ils ont alors quitté les terres agricoles pour habiter près des ports de pêche. Désormais, les effectifs, tant des bateaux que des pêcheurs, ont fortement chuté, au profit des secteurs économiques secondaires et tertiaires.

Le projet de RNR concerne 10 petites communes avec une populations allant de 316 habitants pour Tréguennec à 6223 habitants pour Plonéour-Lanvern en 2019. La tendance démographique est globalement à la hausse sur les vingt dernières années, exception faite des communes de Tréguennec et de Penmarc'h dont les tendances sont négatives.

1.3 - Contexte administratif

1.3.1 - PROTECTIONS EXISTANTES SUR LE TERRITOIRE

(a) *Protections réglementaires*

Divers outils réglementaires de protection de l'environnement et des paysages s'appliquent déjà sur le site :

La **baie d'Audierne** est **classée** au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Un arrêté ministériel de classement du 12 avril 1989 interdit, sauf dérogation

préfecturale, toutes modifications ou destructions du site ainsi que le camping et la publicité dans le périmètre du site classé.

Le **site de Saint-Guérolé (Penmarc'h)** est **inscrit** au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Un arrêté ministériel d'inscription du 25 août 1936 interdit, sauf déclaration préalable, toutes modifications ou destructions du site ainsi que le camping et la publicité dans le périmètre du site classé. Ce zonage est situé en dehors du périmètre de la future RNR, mais reste à proximité directe.

Des **Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes** (APPB) s'appliquent sur les sites de Kerharo et Kerboulén (APPB du 24/01/2002). Ils fixent les mesures de conservation du milieu naturel et la préservation de cinq espèces floristiques protégées au niveau national : le Liparis de Loesel (*Liparis loeselii*), la Spiranthe d'été (*Spiranthes aestivalis*), le Bouton d'or à feuille d'ophioglosse (*Ranunculus ophioglossifolius*), l'Orchis punaise (*Orchis coriophora*), et le Séparias à petite feuille (*Serapia parviflora*).

Un nouvel **APPB** a récemment été mis en place en mars 2020 sur l'estran et le cordon littoral au niveau des étangs de Trunvel et de Kergalan afin de protéger la reproduction du Gravelot à collier interrompu (*Anarynchus alexandrius*).

L'**arrêté liste départemental des sites d'intérêt géologique** (Arrêté n°29-2021-05-05-00015) protège deux sites dans le périmètre du projet de la RNR : le cordon littoral fossile de Ru-Vein en Plovan et la carrière du moulin de Pontalan à Peumerit. Cet arrêté interdit toute activité pouvant altérer ou dégrader le site et le matériel géologique qu'il contient.

La **réserve de chasse maritime** a été **instituée** par arrêté ministériel du 25 juillet 1973 dont la réglementation ne porte que sur l'exercice de la chasse. Cette zone est située sur le Domaine public maritime (DPM) au droit des étangs de Kergalan et de Trunvel et s'étend sur un mile nautique à partir des plus basses mers, soit 850 ha. Elle permet notamment la protection des passées d'oiseaux d'eau (axes de déplacement des oiseaux, en migration ou pour rejoindre les sites de nourrissage/dortoirs, etc.).

Les **Arrêtés municipaux** des communes concernées par les espaces naturels du Conservatoire du littoral et ceux du Département du Finistère sur le territoire du Pays Bigouden Sud réglementent l'accueil du public et les usages dans les sites naturels et la préservation de ceux-ci. Il est à noter que ces réglementations municipales seront utiles pour la mise en place de règles de préservation de la biodiversité pour notre future réserve naturelle régionale Dunes et paluds bigoudènes.

Des **terrains** sont **classés Ns, espaces remarquables et proches du rivage** au titre des documents d'urbanisme (Plans locaux d'urbanisme) en application des articles L. 146-6 et R. 146-1 du Code de l'Urbanisme (Loi Littoral du 3/01/86).

Carte des outils réglementaires et fonciers pour la protection de l'environnement existants sur le site des dunes et paluds bigoudènes

(b) Protections foncières

Le **Conservatoire du littoral** a acquis 782,25 ha (2025) depuis 1982 sur l'ensemble des sites de la baie d'Audierne et des marais de Lescors et de la Joie (Penmarc'h, Plomeur, Saint-Jean-Trolimon, Tréguennec, Tréogat et Plovan). Après acquisition, les terrains deviennent inaliénables et un gestionnaire est désigné localement pour répondre aux besoins de gestion (la CCPBS au sud et la CCHPB au nord).

Le **Conseil départemental du Finistère** a acquis environ 69 ha depuis 2012 sur les 10 communes concernées par le projet de RNR dans le cadre de sa compétence pour les Espaces Naturels Sensibles. 2,75 ha sont situés sur la commune de Plozévet (sites de Pellan et Gorrequer) et 66,29 ha sur la commune de Penmarc'h (sites du Ster et de Poulguen, hors périmètre projet RNR).

(c) Protections contractuelles ou au titre de conventions et d'engagements européens ou internationaux

La baie d'Audierne est devenue le 51^{ème} site français **labellisé Ramsar** le 4 septembre 2021. Ce label international compte plus de 2 400 sites dans le monde et vaut reconnaissance de la valeur patrimoniale des zones humides du territoire et des efforts réalisés en termes de protection et de gestion de ce patrimoine.

Les deux **Directives européennes « Oiseaux » (DO) et « Habitats Faune Flore » (DHFF)**, s'appliquent sur le périmètre du site. La Zone de Protection Spéciale (ZPS) s'étend sur 1 709 ha et la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) représente un total de 2 455,5 ha. 20 habitats naturels d'intérêt communautaire y ont été recensés et font l'objet d'actions de préservation. Ce sont également 6 espèces de l'Annexe II de la DHFF et 97 espèces d'oiseaux de l'Annexe I et migratrice de la DO qui ont permis d'intégrer le site au réseau européen Natura 2000. La conservation de la dune, des milieux humides et de certaines espèces sont les enjeux principaux du site.

Carte des outils contractuels pour la protection de l'environnement existants sur le site des dunes et paluds bigoudènes

1.3.2 - PROJET DE RNR DUNES ET PALUDS BIGOUDENES

Le périmètre du projet de RNR bigoudène a été travaillé en plusieurs étapes. Son périmètre maximal d'étude, dit « périmètre scientifique », concerne 10 communes (Penmarc'h, Plomeur, St-Jean-Trolimon, Tréguennec, Tréogat, Plovan, Peumerit, Pouldreuzic et Plozévet) pour une surface de 2 421,9 ha dont 817 ha de Domaine public maritime (DPM).

Le périmètre retenu pour le déploiement de la démarche d'animation foncière couvre une surface de 1 785,2 ha sur les 10 communes citées précédemment. Il concerne 14 propriétaires public et 457 propriétaires privés identifiés pour respectivement 872 parcelles (889,5 ha) et 618 parcelles (395,7 ha) ainsi que 500 ha de DPM.

Au 21/05/25, le périmètre présenté pour la demande de classement concerne 1393,6 ha et concerne 9 propriétaires publics (1 307,6 ha) et 61 propriétaires privés (86 ha).

2 - Connaissances scientifiques

2.1 - Contexte environnemental

2.1.1 - CADRE CLIMATIQUE

Par rapport à la région bretonne, la baie d'Audierne est relativement peu arrosée par les pluies, notamment dans sa partie sud. Aucun obstacle, ni relief ne vient perturber les vents d'ouest chargés en humidité qui poursuivent leur route vers les terres. Les **précipitations** moyennes sur le site se situent entre 700 mm et 850 mm par an (cf figure 3).

Figure 3 : Précipitations enregistrées à la station Pointe de Penmarc'h (Source : Infoclimat).

Les **températures** sont douces (moyenne annuelle d'environ 12°C), sans grande amplitude saisonnière et relativement homogènes sur le site (cf figure 4). La douceur de ce climat s'explique par la présence immédiate de l'océan qui joue le rôle de tampon thermique.

Figure 4 : Diagramme ombrothermique – station Pointe de Penmarc'h, données climatiques de 1991 à 2020 (Source : Infoclimat).

Toutefois les vents sur le territoire sont assez violents et omniprésents (cf figure 5), avec des vents dominants de secteurs ouest/nord-ouest. La période où les vents sont les plus forts, va d'octobre à début avril. Concernant l'ensoleillement, le site approche les 2 000 heures annuelles.

Figure 5 : Vents et rafales enregistrés à la station Pointe de Penmarc'h (Source : Infoclimat).

La baie d'Audierne se trouve au croisement de deux **écorégions marines** (Spalding *et al.*, 2007) : les mers celtiques et le plateau continental atlantique sud-européen. Elle se situe également en limite de trois **zones climatiques régionales** (cf figure 6). Cela constitue un élément important dans la richesse écologique du territoire en permettant l'installation d'espèces à affinité septentrionale ainsi que d'espèces à affinité méridionale. Elle représente ainsi une zone géographique de **limite de répartition** pour diverses espèces.

Figure 6 : Zones climatiques de Bretagne (Source : OEB)

2.1.2 - CADRE HYDROGRAPHIQUE

Le **réseau hydrographique** est peu important en termes de linéaire, malgré l'étendue de la baie. Les bassins versants des cours d'eau qui y aboutissent sont peu développés et couvrent environ 11 400 ha. Ils totalisent un linéaire de cours d'eau avoisinant 156 km (cf figure 7). Ce sont en majorité de petits cours d'eau de faible débit, inférieur à 1m³/sec.

Figure 7 : Carte des sous-bassins-versants du SAGE Ouest-Cornouaille (Source : Ouesco)

L'encaissement des vallées de Trunvel et de Kergalan laisse supposer un débit passé des cours d'eau plus conséquent pendant les périodes de régression des niveaux marins. Le débit des cours d'eau répond de manière très rapide à la pluviométrie. En effet, la nature géologique du sol ne permet pas le stockage de grandes réserves d'eau. Lors de périodes de fortes précipitations, les zones basses en arrière des cordons littoraux sont régulièrement inondées comme on l'observe, tous les hivers, au Loc'h ar Stang par exemple. Les retenues d'eau ainsi créées s'évacuent à la mer en passant sous la dune, voire en perçant le cordon littoral et s'écoulant au travers des brèches. Celles-ci offrent un passage entre les milieux terrestres et marins et assurent la continuité écologique pour les espèces amphihalines.

Le cordon littoral a fermé les exutoires des cours d'eau et a favorisé le stockage de l'eau sous forme d'étangs et de marais. Les étangs de Trunvel et de Kergalan sont considérés comme les **plus grands étangs naturels du Finistère**. La pluviométrie étant plus importante en allant vers le nord, les débits des cours d'eau sont également plus conséquents au nord qu'au sud. Les variations de niveau de la nappe phréatique et des débits des ruisseaux de la baie d'Audierne ont généré des **zones humides** propices à l'installation d'une faune et d'une flore exceptionnelles. La faible déclivité du sol au niveau des régions bordant ces zones humides et l'absence d'exutoire permanent favorisent les variations importantes en termes de surfaces d'expansion des eaux lors d'épisodes pluvieux prolongés. Certains secteurs, peu drainants, sont affectés par des phénomènes d'hydromorphie (sol saturé en eau) visibles notamment au niveau des étangs de Kergalan, Trunvel, des marais du Loc'h ar Stang, de Lescors et du marais de la Joie en Penmarc'h.

Ouesco, l'établissement en charge de la mise en œuvre du SAGE Ouest Cornouaille, réalise chaque année des prélèvements d'eau pour en analyser la qualité et ainsi suivre l'évolution de l'**état des masses d'eau** du territoire. En 2019, les analyses permettent d'établir un résultat de 60 % des masses d'eau conformes au bon état (cf figure 8). Les paramètres déclassants sont les nitrates et les pesticides.

Figure 8 : Etat des masses d'eau du SAGE Ouest-Cornouaille (Source : Ouesco)

2.1.3 - CADRE GEOLOGIQUE

La compréhension de la **géologie** des Dunes et paluds bigoudènes, son histoire et sa structure, sont essentielles pour appréhender l'état actuel de cette frange littorale et anticiper son évolution dans le temps (cf figures 9 et 10).

La baie d'Audierne est limitée par deux saillants de roches granitiques dures, le cap Sizun au nord (leucogranite de la pointe du Raz) et le cap Caval au sud (granite de Pont-l'Abbé et granite à muscovite dominante du Guilvinec). Entre ces extrémités s'étendent des formations métamorphiques comprenant de vastes affleurements de micaschistes, entrecoupés d'importantes inclusions de roches vertes basiques : amphibolites et serpentines (Cogné, 1960). Le contraste de résistance entre ces roches explique les effets de l'action différentielle de l'érosion. Celle-ci se traduit par une côte élevée à falaise au nord, une côte de plates-formes rocheuses au sud et, au centre, une baie sableuse, largement ouverte, peu profonde, dégagée dans les formations micaschisteuses plus tendres.

Figure 9 : Carte géologique des abords de la baie d'Audierne (Source : BRGM)

Les premières étapes de l'histoire géologique de la baie d'Audierne remontent à l'Ordovicien lors de la dislocation d'un vaste continent, le Gondwana. L'activité volcanique et l'ouverture d'un océan liées à l'étirement des marges du Gondwana sont à l'origine des orthogneiss de Languidou (- 480 Ma) ainsi que des serpentinites, gabbros et prasinites (complexe ophiolitique).

Environ 100 millions d'années plus tard, la disparition progressive de cet océan lors de phénomènes de subduction expose les roches à des conditions de pressions et de températures telles qu'elles se transforment. Des roches métamorphiques, les éclogites de Kergroas et les granulites de Keramoine (-380 Ma), témoignent de cet épisode.

Lors de la collision entre le Gondwana et le continent Armorica (orogénèse hercynienne), les roches en place sont profondément déformées, plissées, chevauchées. Les traces laissées par ces

mécanismes de surrection de la chaîne de montagnes sont aujourd'hui visibles sur le site avec les micaschistes de Penhors.

La chaîne de montagnes soumise à l'érosion et fracturée par le mouvement des roches les unes par rapport aux autres, est ponctuellement injectée de filons de quartz comme ceux de Minven en Tréogat par exemple.

Figure 10 : Carte géologique simplifiée de la Baie d'Audierne, en Bretagne occidentale et coupe géologique Plozévet-Penmarc'h (Blais et al., 2011)

Survient ensuite une longue période d'érosion et il faut attendre le début du Quaternaire pour que les alternances d'épisodes glaciaires et interglaciaires laissent de nouveau des traces dans le paysage géologique du territoire avec d'importantes accumulations de sables et de galets (cf chapitre cadre géomorphologique). L'ancien cordon de galets pléistocène témoigne d'une période de transgression marine par sa position perchée et donc plus élevée que le niveau actuel de la mer (Guilcher & Hallegouet, 1981). L'action des agents érosifs poursuit encore aujourd'hui son cours.

2.1.4 - CADRE GEOMORPHOLOGIQUE

L'histoire de la formation de la baie d'Audierne est intimement liée aux variations du niveau de la mer. Ce dernier a évolué au cours des temps géologiques avec l'alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. Ces fluctuations sont associées respectivement à une régression marine (abaissement du niveau des mers qui sont alors piégées dans les glaces) ou à une transgression marine (montée du niveau marin liée à la fonte des glaces).

Lors des régressions marines, les surfaces offertes aux agents érosifs tels que sont le vent, les variations thermiques - notamment alternances gel / dégel - et le ruissellement, sont immenses. Les matériaux libérés par ces phénomènes d'érosion sont mobilisés soit par le vent si leur masse le permet, soit par la mer lors de sa remontée, pour les éléments les plus gros.

A l'échelle de la baie d'Audierne, la transgression post-glaciaire a repoussé de grandes quantités de sédiments plus ou moins grossiers entre les deux pointes rocheuses (cap Sizun au nord et cap Caval au sud). Les éléments de petite taille (sables) arrachés par l'érosion au substrat rocheux ont été véhiculés et redistribués par les vents principalement orientés ouest et se sont déposés vers les terres, lorsque l'énergie éolienne s'est affaiblie. Ils se sont ainsi étalés sur l'ensemble du plateau (3 à 4 kilomètres jusqu'au pied de la falaise morte) pendant le Petit Âge Glaciaire jusqu'au XIX^{ème} siècle, formant les grandes paluds typiques de la baie d'Audierne. Les dunes actuelles ont commencé à se mettre en place durant l'Âge de Fer. Elles s'étendent sur 15 kilomètres de long et plus de 1 kilomètre de large au droit de Saint-Vio.

Cordon dunaire - Tréguennec

Ero vilí vu depuis la plage de Ru vein à Plovan

L'incision des vallons du plateau débouchant dans la baie d'Audierne (Trunvel et Kergalan principalement) s'est faite lors des phases de régressions glacio-eustatiques. Ces vallées ont été fossilisées par les sédiments marins lors de la transgression flandrienne (environ 15 000 av JC).

Roulés et agencés par les vagues sur des milliers d'années, les galets du cordon pléistocène plaqué sur le versant continental au nord de la baie entre Plouhinec et Plovan, ont peu à peu été remobilisés jusqu'à former un nouveau cordon de galets, l'Ero vili. Celui-ci se serait mis en place progressivement vers le sud, jusqu'à atteindre le promontoire de la Torche, au gré des courants littoraux et des houles déferlant en oblique. Le cordon de galets a été largement exploité durant la seconde Guerre Mondiale pour la construction du mur de l'Atlantique. Cette exploitation s'est poursuivie quelques années après la fin de la guerre par des entrepreneurs locaux pour la reconstruction de la ville de Brest. Ainsi 400 000 m³ (1 million de tonnes) ont été extraits du cordon qui s'en trouve affaibli. Il s'étire aujourd'hui sur environ 5,5 km avec une épaisseur de 4 à 5 m et une largeur de 50 mètres environ.

Figure 11: Morphologie du littoral de la baie d'Audierne entre Penhors et la pointe de la Torche (Source : Faye I., 2004).

2.2 - Patrimoine naturel

2.2.1 - PATRIMOINE GEOLOGIQUE

Dans son ouvrage « Curiosités géologiques du Pays bigouden » Sylvain Blais (Blais S., 2011) présente les éléments géologiques remarquables observables en baie d'Audierne. Sur le périmètre de la future RNR, 6 sites d'intérêts sont présentés : du nord au sud, les micaschistes du port de Penhors, la serpentinite du moulin de Pontalan, le cordon de galets actuel de Stang ar Liou, l'ancien cordon de galets de Ru-Vein, la leptynite de Prat-ar-Hastel et les dunes de Tronoën.

Deux d'entre eux sont également inscrits à l'inventaire national du patrimoine géologique : l'ancien cordon de galets de Ru vein et la serpentinite du moulin de Pontalan.

(a) Cordons de galets

Les cordons de galets, ancien et actuel, constituent des formations géologiques notables pour le territoire. Les galets qui les composent sont d'origines extrêmement variées. Certains viennent de roches locales, et d'autres ont une origine inconnue, tels les silex et les microgranites.

Une partie de l'ancien cordon de galets de Ru Vein est par ailleurs inscrit à l'inventaire national du patrimoine géologique (INPG) sous l'identifiant « BRE0114 - Cordon littoral fossile (Pleistocène) de Ru-Vein – Plovan ».

L'évaluation de l'intérêt patrimonial des sites retenus (De Wever *et al.*, 2006 ; De Wever *et al.*, 2014) est réalisée à partir des critères suivants : intérêts géologiques principal et secondaire, intérêt pédagogique, intérêt pour l'histoire de la géologie, rareté et état de conservation. Chaque critère est pondéré par un coefficient afin de mettre en valeur son importance au regard des autres critères. La note totale ainsi obtenue permet d'attribuer une valeur patrimoniale au site.

Tableau 1 : Valeur patrimoniale de Ru Vein - Source : INPG

Identifiant INPG		BRE0114
Intérêt géologique principal (x 4)	Notes de 0 à 3	3
Intérêt géologique secondaire (x 3)		0
Intérêt pédagogique (x3)		2
Intérêt pour l'histoire de la géologie (x2)		0
Rareté (x 2)		1
Etat de conservation (x2)		1
Valeur patrimoniale (total/48)		22
Intérêt géologique patrimonial (/***)		**

Ero vili et cordon Pléistocène affleurant en falaise à Ru Vein

Carrière de Ru Vein, galets du cordon Pléistocène redressés dans la matrice (cryoturbation)

Ce site est caractérisé **d'intérêt régional** (intérêt patrimonial fort) car il permet d'observer l'ancien cordon de galets (300 000 ans av JC.) de la baie d'Audierne et montre localement des concentrations de galets dont la position verticale atteste de phénomènes de cryoturbation (modification du sol par l'effet du gel et du dégel) datant d'il y a plus de 20 000 ans.

Il est toutefois important de noter que le périmètre retenu à l'INPG correspond, sous format numérique, au secteur Nord d'une ancienne carrière d'exploitation du cordon (cf figure 12 - secteur jaune) sans inclure l'affleurement en falaise le long de la plage qui est pourtant mentionné dans la fiche descriptive du site BRE0114 (cf figure 12 - secteur violet). En outre, le périmètre retenu pour

l'arrêté liste des sites d'intérêt géologique de Finistère correspond au secteur Sud de la carrière (cf figure 12 - secteur vert).

Figure 12 : Localisation des différents secteurs d'affleurement du cordon de galets pléistocène

Chacun de ces 3 secteurs présente des caractéristiques différentes mais intéressantes pour la lecture du cordon Pléistocène (Alain Henaff, comm. pers.) :

- L'affleurement en falaise sur la plage est régulièrement rafraîchi lors des épisodes de tempête et de grandes marées et offre ainsi des conditions optimales d'observation contrairement à la zone de carrière où la végétation recouvre peu à peu les fronts de taille ;
- Le secteur retenu à l'INPG a été moins exploité pendant la période d'activité de la carrière, la structure du cordon y est donc mieux conservée ;
- Le secteur retenu pour les sites d'intérêt géologique (SIG) du Finistère présente des fronts de taille plus nets et permet une meilleure observation des galets redressés dans la matrice.

Il semblerait donc que l'ensemble des trois secteurs (jaune, violet et vert) soient à retenir pour l'intérêt patrimonial qu'ils représentent.

(b) Serpentine

Les affleurements de serpentine, roche basique constitutive d'un ancien plancher océanique, constituent également un patrimoine remarquable pour le territoire, tant au point de vue géologique, qu'écologique.

L'ancienne carrière située à proximité du moulin de Pontalan (Peumerit) est inscrite à l'INPG sous l'identifiant « BRE0183 – Périodite serpentinisé du moulin de Pontalan – Peumerit ».

Tableau 2 : Valeur patrimoniale de la carrière de Pontalan - Source : INPG

Identifiant INPG		BRE0183
Intérêt géologique principal (x 4)	Notes de 0 à 3	3
Intérêt géologique secondaire (x 3)		1
Intérêt pédagogique (x3)		2
Intérêt pour l'histoire de la géologie (x2)		0
Rareté (x 2)		1
Etat de conservation (x2)		3
Valeur patrimoniale (total/48)		29
Intérêt géologique patrimonial (/***)		**

Le site de Pontalan est également caractérisé **d'intérêt régional** (intérêt patrimonial fort) en raison des conditions d'observation optimales qu'il offre sur l'un des rares affleurements de serpentine. Il témoigne ainsi de l'existence passée d'un océan sud-armoricain et du phénomène d'obduction lors de la mise en place de la chaîne hercynienne.

Figure 14 : Bloc de serpentine - carrière de Pontalan (Peumerit)

De nouveau, une différence peut être remarquée entre la couche cartographique numérique de l'INPG (cf figure 14 – secteur jaune) et les délimitations retenues dans le dossier préparatoire de l'arrêté liste départemental pour les sites d'intérêt géologique (cf figure 14 – secteur vert). L'emplacement de l'ancienne carrière est facilement visible par photo aérienne (végétation clairsemée et sol apparent) et se situe au niveau du secteur retenu pour les sites d'intérêt géologique du Finistère. C'est donc ce zonage qui sera considéré dans le cadre de ce projet de Réserve naturelle régionale.

Figure 13 : Localisation des zonages de l'INPG et de l'arrêté liste pour les SIG 29

(c) **Gisement de lithium**

Un gisement de lithium évalué à 66 300 tonnes Li₂O a été identifié sur la commune de Tréguennec (Gloaguen *et al.*, 2018) au sein du secteur concerné par la future RNR. Si le gouvernement a émis le souhait de se pencher sur la question de l'extraction de lithium en France, aucun titre minier d'exploitation n'est actuellement attribué pour ce gisement. Par ailleurs, étant localisé en site classé, site Natura 2000, site Ramsar, sur des propriétés du Conservatoire du littoral et dans le périmètre souhaité de la future RNR, son exploitation n'est pas envisagée et nécessiterait une prise en compte forte des enjeux environnementaux.

2.2.2 - HABITATS

En 2001, dans le cadre de la mise en place de la Directive européenne « habitats, faune, flore », le CBN de Brest a réalisé une cartographie des habitats (semi-)naturels terrestres du site désigné au titre de Natura 2000. Faute d'actualisation, cette cartographie fait toujours référence sur le site. Toutefois, des modifications sont survenues depuis 2001 en termes de surfaces, d'états de conservation et d'interprétation des différents habitats inventoriés. En effet, ces vingt dernières années ont vu une évolution des milieux, de manière naturelle ou sous l'impact des pressions qui s'y exercent, mais également des actions de gestion menées en faveur de la protection des habitats naturels. Les connaissances sur les habitats d'intérêt communautaire ont également été améliorées (avec la publication des cahiers d'habitats français notamment).

L'ensemble du périmètre du projet de RNR pour le site des dunes et paluds bigoudènes n'est pas couvert par cette cartographie. Le marais de la Joie ainsi que les landes sur serpentine intérieures n'ont pas été concernés par l'inventaire de 2001, il n'existe donc pas actuellement de données sur les habitats naturels de ces secteurs. Les surfaces indiquées dans le tableau 3 sont donc à nuancer et permettent plutôt d'estimer la représentativité des habitats les uns par rapport aux autres. Par ailleurs la cartographie de 2001 portait sur les habitats naturels terrestres. Les habitats marins recensés n'ont donc pas fait l'objet d'investigations précises à l'exception de l'habitat prioritaire 1150 – Lagunes côtières.

Tableau 3 : Liste des Habitats d'intérêt communautaire (non déclinés en habitats élémentaires) - Source : CBNB, 2001

Habitats d'intérêt communautaire		Surface N2000 (en ha)	Responsabilité Bretagne	Responsabilité site
Code UE	Intitulé français			
1210	Végétation annuelle des laissés de mer	1,3	Très élevée	Très élevée
1220	Végétation vivace des rivages de galets	2,31	Très élevée	Élevée
1230	Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques	6,3	Très élevée	Élevée
1310	Végétations pionnières à <i>Salicornia</i> et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses	0,21	Très élevée	Élevée
1330	Prés-salés atlantiques (<i>Glauco-Puccinellietalia maritima</i>)	0,58	Très élevée	Élevée
1410 ¹	Prés-salés méditerranéens (<i>Juncetalia maritimi</i>)	18,31	Élevée	Élevée
2110	Dunes mobiles embryonnaires	6,02	Élevée	Très élevée
2120	Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> (dunes blanches)	49,9	Très élevée	Très élevée
2130*	Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)	326,91	Très élevée	Très élevée

2170	Dunes à <i>Salix repens</i> spp. <i>argentea</i> (<i>Salicion arenariae</i>)	28,12	Très élevée	Très élevée
2190	Dépressions humides intradunaires	111,72	Très élevée	Très élevée
3150	Lacs eutrophes naturels avec végétation du <i>Magnopotamion</i> ou de l' <i>Hydrocharition</i>	49,7	Mineure	Élevée
4030	Landes sèches européennes	7,37	Élevée	Modérée
6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin	0,93	Modérée	Modérée

¹ Présence sur le site restant à confirmer

*Habitats d'intérêt communautaire prioritaire

Les données issues de la cartographie Carpediem des habitats benthiques réalisée par l'OFB (2019) selon la typologie EUNIS permet de détailler les habitats marins 1170 et 1110 identifiées par la cartographie Natura 2000 de 2001. Ces données font en effet état de 5 habitats marins dans le périmètre du projet (cf tableau 4).

Tableau 4 : Habitats marins identifiés dans le périmètre du projet de RNR bigoudène. Source : Quadrige - cartographie Carpediem, OFB 2019.

Habitats d'intérêt communautaire		Cartographie Carpediem	
Code UE	Intitulé français	Code EUNIS	Dénomination de l'habitat
1170	Récifs	A3.1	Roche infralittorale de l'Atlantique et de la Méditerranée sous fort hydrodynamisme
		A3.3	Roche infralittorale de l'Atlantique et de la Méditerranée sous faible hydrodynamisme
		A4.1	Roche circalittorale de l'Atlantique et de la Méditerranée sous fort hydrodynamisme
1110	Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine	A5.23	Sable fin infralittoral
		A5.24	Sable vaseux infralittoral
1150*	Lagunes côtières		

Si les habitats marins de sable fin et de sable vaseux infralittoral sont largement majoritaires dans le périmètre du projet, leur cartographie précise serait nécessaire pour permettre d'estimer les surfaces associées à chaque milieu.

Le site Natura 2000 baie d'Audierne abrite une vingtaine d'habitats terrestres, aquatiques et marins d'intérêt communautaire que l'on retrouve dans le périmètre du projet de RNR. Les enjeux en matière de conservation des habitats naturels portent majoritairement sur la succession dunaire (estran, dune mobile, dune grise, dépression intradunaire) qui abritent environ 40 % des taxons à enjeu du site. Ces habitats sont particulièrement bien représentés puisqu'il s'agit du deuxième massif dunaire de Bretagne avec plus de 520 ha. Les dunes grises sont considérées comme un enjeu prioritaire de conservation à l'échelle européenne. Elles ont été jugées dans un état de conservation globalement satisfaisant en 2001, ce qui devrait persister au regard des actions de gestion et de préservation mises en place depuis quelques années.

Les zones humides arrières littorales sont également bien représentées et l'écosystème qu'elles forment en contexte dunaire est particulièrement intéressant. En effet, les zones humides sont souvent imbriquées dans ces milieux secs, ce qui favorise l'expression de la biodiversité dans ces écotones. Ces milieux abritent environ 20 % des taxons à enjeux du site.

Les landes sur serpentine du Pays bigouden, peu représentées en termes de surface, sont uniques en Bretagne. Les caractéristiques géologiques de la serpentine conduisent au développement d'une végétation particulière associant des espèces typiques des landes sur sol acide (ex : Bruyère cendrée – *Erica cinerea*) et des espèces à affinités calcicoles (ex : Filipendule commune – *Filipendula vulgaris*) qui sont généralement retrouvées en milieu dunaire en Bretagne.

2.2.3 - FLORE

(a) Flore vasculaire

Plus de 800 taxons floristiques ont été inventoriés sur le site d'étude dont 3 sont d'intérêt communautaire, 23 sont protégés et 49 sont considérés rares et/ou menacés dans les listes rouges régionale ou nationale (Laurent E., 2023).

La zone constitue une limite d'aire de répartition septentrionale pour certaines espèces végétales comme l'Astragale de Bayonne (*Astragalus baionensis*). Certaines espèces à affinités méridionales peuvent également être retrouvées sur le territoire. C'est le cas par exemple du Diotis maritime (*Otanthus maritimus*) ou encore de la Renouée maritime (*Polygonum maritimum*) dont les mentions au nord de la baie d'Audierne sont peu courantes.

Le site abrite également une sous-espèce considérée actuellement comme endémique du territoire : la Fétuque bigoudène (*Festuca ovina* subsp. *bigoudensis*).

L'évaluation des enjeux, selon la méthodologie proposée par M. Hardegen et E. Quéré (2019), permet de mettre en évidence 76 taxons au sein du périmètre d'étude depuis 1980 (cf annexe 1), dont :

- 3 taxons à « enjeu majeur »,
- 26 taxons à « enjeu très fort »,
- 22 taxons à « enjeu fort »,
- 9 taxons à « enjeu réglementaire »,
- 15 « autres taxons intéressants »
- 1 taxon non signalé récemment en Bretagne et dont la station locale a été détruite.

Le tableau ci-dessous présente la liste des taxons à enjeu majeur, très fort et fort.

Tableau 5 : Liste de la flore à enjeu majeur, très fort ou fort (d'après Laurent E., 2023).

Enjeu	Nom du taxon	DHFF 1992	Protec.	LR Nat	LR Bzh	LRMA
NSR Bretagne	<i>Anchusa azurea</i>	-		LC	RE	anx2
Majeur	<i>Festuca ovina</i> subsp. <i>bigoudenensis</i>	-	Reg BZH	NE	EN	anx1
	<i>Myosotis sicula</i>	-	Reg BZH	NT	EN	anx1
	<i>Polygonum oxyspermum</i> subsp. <i>raii</i>	-	Nat	NT	VU	anx1
Très fort	<i>Apera interrupta</i>	-	-	LC	VU	-
	<i>Avena sterilis</i> subsp. <i>ludoviciana</i>	-	-	LC	NE	-
	<i>Carex acutiformis</i>	-	-	LC	EN	anx2
	<i>Eleocharis quinqueflora</i>	-	-	LC	EN	anx1
	<i>Gymnadenia conopsea</i>	-	-	LC	VU	anx1
	<i>Hippuris vulgaris</i>	-	-	NT	VU	anx1
	<i>Juncus subnodulosus</i>	-	-	LC	VU	-

	<i>Lathyrus palustris</i> subsp. <i>palustris</i>	-	-	EN	CR	anx1
	<i>Legousia hybrida</i>	-	-	LC	CR	anx1
	<i>Liparis loeselii</i> var. <i>loeselii</i>	anx2&4	Nat	NE	NT	-
	<i>Lithospermum arvense</i>	-	-	LC	EN	-
	<i>Lithospermum officinale</i>	-	-	LC	VU	anx1
	<i>Onopordum acanthium</i> subsp. <i>acanthium</i>	-	-	LC	VU	-
	<i>Orchis palustris</i>	-	Reg BZH	VU	VU	anx1
	<i>Otanthus maritimus</i>	-	Reg BZH	LC	VU	anx1
	<i>Potamogeton coloratus</i>	-	-	LC	VU	anx1
	<i>Ranunculus circinatus</i>	-	-	LC	NE	anx1
	<i>Ranunculus lingua</i>	-	Nat	VU	LC	anx1
	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>	-	Nat	LC	VU	anx1
	<i>Sagina nodosa</i>	-	Reg BZH	NT	VU	anx1
	<i>Scirpus pungens</i>	-	-	LC	VU	anx1
	<i>Spiranthes aestivalis</i>	anx4	Nat	VU	NT	anx1
	<i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordioides</i>	-	-	LC	VU	anx1
	<i>Thalictrum flavum</i> subsp. <i>flavum</i>	-	-	LC	VU	anx1
	<i>Triglochin palustris</i>	-	-	LC	VU	anx2
	<i>Urtica membranacea</i>	-	Reg BZH	LC	VU	anx1
Fort	<i>Astragalus baionensis</i>	-	Nat	LC	NT	anx1
	<i>Berula erecta</i>	-	-	LC	NT	anx2
	<i>Butomus umbellatus</i>	-	-	LC	NT	anx2
	<i>submersum</i>	-	-	LC	NT	anx1
	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i>	-	-	NT	NT	anx2
	<i>Eleocharis uniglumis</i>	-	-	LC	NT	-
	<i>Epipactis palustris</i>	-	-	NT	LC	-
	<i>Filipendula vulgaris</i>	-	-	LC	NT	anx1
	<i>Gastroidium ventricosum</i>	-	-	LC	NT	-
	<i>Lepidium latifolium</i>	-	-	LC	NT	anx2
	<i>Medicago marina</i>	-	-	LC	NT	-
	<i>Ononis reclinata</i>	-	-	LC	NT	anx1
	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	-	Reg BZH	LC	NT	anx1
	<i>Papaver argemone</i>	-	-	LC	NT	-
	<i>Papaver hybridum</i>	-	-	LC	NT	-
	<i>Polygonum maritimum</i>	-	Reg BZH	LC	NT	anx1
	<i>Potamogeton pusillus</i>	-	-	LC	NT	
	<i>Ranunculus baudotii</i>	-	-	LC	NT	anx2
	<i>Trifolium strictum</i>	-	-	LC	NT	anx2
	<i>Triglochin bulbosum</i> subsp. <i>barrelieri</i>	-	-	LC	NT	anx1
<i>Vulpia ciliata</i> subsp. <i>ambigua</i>	-	-	LC	NT	-	
<i>Vulpia ciliata</i> subsp. <i>ciliata</i>	-	-	LC	NT	-	

Enjeu : résultat de l'évaluation des enjeux floristiques selon la méthode proposée par Hardegen & Quéré, 2019 ;

Nom : selon le Référentiel nomenclatural de la flore de l'ouest de la France : <http://www.cbnbrest.fr/RNFO/> (juillet 2023) ;

DHFF 1992 : inscription du taxon à l'annexe 2 et/ou 4 de la directive européenne Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE ;

Protec. : « Nat » pour les taxons protégés à l'échelle nationale par l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national, « Reg BZH » pour les taxons protégés à l'échelle régionale par l'arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant la liste nationale ;
LR Nat / LR Bzh : catégorie de menace sur la Liste rouge des espèces menacées en France (UICN France & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018) / sur la Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne (Quéré, Magnanon, Brindejonc, 2015) : « RE » pour les taxons non revus, « CR » pour les taxons en danger critique, « EN » pour les taxons en danger, « VU » pour les taxons vulnérables, « NT » pour les taxons quasi-menacés, « LC » pour les taxons de préoccupation mineure, « DD » pour les taxons pour lesquels les données sont déficientes, « NE » pour les taxons non évalués ;
LRMA : inscription du taxon sur la Liste rouge du Massif armoricain (Magnanon, 1993) organisée en 2 principales annexes : « anx1 » pour les taxons considérés comme rares dans tout le Massif armoricain ou subissant une menace générale très forte et « anx2 » pour les taxons rares sur une partie du territoire et plus communs ailleurs mais paraissant néanmoins menacés et/ou plantes en limite d'aire, rares dans le Massif armoricain mais assez communes à l'extérieur de nos limites ;

Vingt espèces exotiques envahissantes ont également été observées sur le site : dix espèces invasives avérées et 10 espèces invasives potentielles. 15 espèces à surveiller ont également été observées au sein du périmètre (cf annexe 1). Les invasives avérées sont les suivantes :

- *Ludwigia peploides* (Kunth) P.H.Raven
- *Ludwigia uruguayensis* (Cambess.) H.Hara
- *Allium triquetrum* L.
- *Azolla filiculoides* Lam.
- *Baccharis halimifolia* L.
- *Bidens frondosa* L.
- *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
- *Elaeagnus x submacrophylla* Servett.
- *Laurus nobilis* L.
- *Lemna minuta* Kunth

(b) Algues Characées

Deux campagnes d'inventaires complets des Characées ont été menées en baie d'Audierne, en 1994 (Corillion R., 1994), puis entre 2000 et 2006 (Citoleux *et al.*, 2007). En 2024, un inventaire partiel ciblé sur *Chara canescens* a été réalisé dans le cadre d'un projet de recherche. Au total, ces inventaires ont permis d'établir une liste de 16 espèces, soit environ la moitié des espèces connues pour le Massif armoricain.

Tableau 6 : Liste des algues Characées inventoriées en baie d'Audierne faisant l'objet d'un statut de rareté régionale.
 Source (Citoleux *et al.*, 2007) complété par E. Laurent, 2024

Espèce	1994	2000-2006	2024	Rareté Bretagne (eColibry)*
<i>Chara canescens</i> Desv. et Lois.	X	X	X	RR à RRR
<i>Lamprothamnium papulosum</i> (Wallr.) J.Gr.	-	X		RR à RRR
<i>Nitellopsis obtusa</i> (Desv. in Lois.) J.Gr.	X	-		RR à RRR
<i>Tolypella nidifica</i> (O.Müll.) Braun	X	X		RR à RRR
<i>Tolypella salina</i> R. Cor.	-	X		RR à RRR
<i>Chara aspera</i> Deth. ex Willd	X	X	X	AR à R
<i>Chara fragifera</i> Durieu de la Maisonneuve	X	-		AR à R
<i>Chara major</i> Vaillant	X	X	X	AR à R
<i>Chara polyacantha</i> A. Br.	X	X		AR à R
<i>Nitella hyalina</i> (DC.) Agardh, 1824	X	-		AR à R
<i>Chara globularis</i> Thuillier	X	X		AC à C
<i>Chara vulgaris</i> var. <i>longibracteata</i> (Kütz in Reich.) J.Gr. et B.-W.	X	X		AC à C

*AC à C : Taxon plutôt commun, AR à R : Taxon plutôt rare, RR à RRR : Taxon très rare

La baie d'Audierne présente un cortège remarquable d'algues Characées, dont la rarissime *Tolypella salina* (seule espèce de charophyte actuellement protégée sur le territoire national). Le caractère pionnier des Characées leur confère une vulnérabilité particulière aux évolutions des milieux et peuvent donc généralement être considérées comme d'intérêt patrimonial puisque rares et menacées (Le Bail *et al.*, 2012). Cependant, sur les 16 espèces recensées en baie d'Audierne, la présence de 5 espèces est à noter tout particulièrement en raison de leur statut de rareté à l'échelle nationale ou de la Bretagne : *Chara canescens*, *Lamprothamnium papulosum*, *Nitellopsis obtusa*, *Tolypella nidifica* et *Tolypella salina*. Il conviendra donc de retenir ces cinq taxons comme espèces patrimoniales pour le site.

Chara canescens, *Lamprothamnium papulosum* et *Tolypella salina* sont toutes trois associées aux milieux saumâtres et sont donc très dépendantes des apports en sel par les embruns et/ou par les écoulements d'eau de mer au travers du cordon de galets. De ce fait, ces espèces pourraient présenter un caractère à éclipse ou du moins aléatoire selon les conditions météorologiques (Citoleux *et al.*, 2007). Le renouvellement de ces inventaires serait donc à prévoir par des campagnes sur plusieurs années afin d'assurer la meilleure exhaustivité possible.

Une attention doit être portée à la qualité des eaux dont la dégradation par eutrophisation mène progressivement au développement d'herbiers denses au détriment des Characées comme cela a d'ores et déjà été observé à l'étang de Saint-Vio ainsi que sur l'étang de Trunvel.

(c) Phytoplancton

Les campagnes de prélèvements de l'Ifremer de 1989 (Quadrige, 28/03/2024) ont permis d'établir une liste de 74 espèces (cf annexe 2). Ces espèces ne bénéficient actuellement d'aucune liste de référence pour évaluer leur degré de patrimonialité.

Parmi elles, 6 espèces sont introduites, dont une espèce invasive avérée (*Alexandrium minutum*) et 3 espèces invasives à surveiller, d'après l'état des connaissances en 2010 (Siorat, 2010).

2.2.4 - FAUNE

Les données faunistiques disponibles à l'échelle du périmètre d'étude du projet de RNR ont été centralisées et mises en forme par Bretagne vivante dans le cadre de leur partenariat avec les collectivités bigoudènes pour ce projet de RNR¹. Les données ont été analysées et travaillées conjointement par les collectivités en charge du projet et Bretagne vivante, pour réaliser la synthèse présentée ci-après. D'autres sources de données ont également été utilisées : les rapports d'inventaires réalisés sur le site ainsi que la base de données de l'Ifremer (Quadrige, 28/03/2024).

Méthodologie utilisée

La méthodologie utilisée pour l'analyse des données se base sur celle de l'indicateur des espèces patrimoniales pour l'indice de qualité écologique (Delzons *et al.*, 2021). Toutefois, quelques critères complémentaires ont été pris en compte dans le cadre de cette analyse pour chercher à obtenir la

¹ Données issues des bases de données de Faune Bretagne, Bretagne vivante, GRETIA et GMB, transmission le 28/06/2023

meilleure représentativité possible en ce qui concerne les espèces à enjeu, notamment aux échelles régionales et départementales. Une notation différenciée vis-à-vis de la méthode initiale a donc été appliquée pour intégrer ces critères. La méthode de notation employée est présentée en annexe 3.

(a) Avifaune

Plus de 320 espèces d'oiseaux ont été observées ou contactées en l'espace de 50 ans pour l'ensemble de la baie (Buisson, 2010). Elle constitue une zone refuge pour l'avifaune, en témoignant les 136 espèces contactées à la station de suivi de Trunvel de 1988 à 2022 (Guyot et Ernst, 2022). Les roselières littorales sont particulièrement attractives pour les oiseaux en migration : Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*), Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*) ; ou pour la reproduction de certaines espèces telles la Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*), la Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*), la Locustelle luscinoïde (*Locustella luscinioides*) ou le Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*). Elles servent de zone de chasse aux rapaces : Faucon hobereau (*Falco subbuteo*), Faucon émerillon (*Falco columbarius*), Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*), Hibou des marais (*Asio flammeus*). Le Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) y séjourne régulièrement. Le Canard chipeau (*Mareca strepera*) s'y reproduit également. Le site représente de plus un des bastions nationaux pour certaines espèces d'oiseaux nicheurs comme le Gravelot à collier interrompu (*Anarynchus alexandrinus*), la Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*), la Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*) ou encore la Locustelle luscinoïde (*Locustella luscinioides*).

Les données collectées en 2022 à partir des bases de données de Bretagne Vivante, et Faune Bretagne, font état de 330 espèces d'oiseaux connus pour le site dont :

- 262 espèces régulières et 68 espèces occasionnelles ;
- 95 espèces nicheuses régulières et 2 espèces nicheuses anecdotiques ;
- 222 espèces migratrices régulières et 58 espèces migratrices occasionnelles ;
- 144 espèces hivernantes régulières et 25 espèces hivernantes occasionnelles.
- 4 espèces introduites.

Avifaune nicheuse

Sur les 94 espèces nicheuses sur le site (cf annexe 4), 50 peuvent être considérées comme patrimoniales avec :

- 14 espèces à enjeu très fort
- 10 espèces à enjeu fort
- 25 espèces à enjeu modéré

Les espèces à enjeu fort et très fort sont présentées dans le tableau ci-après.

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DO	LR UE	LR Fr	Prot nat	ZNIE FF	LR Bzh	RB Bzh	RB 29	Ind loc.
Très fort	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'été		LC	VU		x	CR	4	3	31,5
	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand gravelot		LC	VU	x	x	EN	5	3	28,8
	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle luscinoïde		LC	EN	x	x	CR	5	3	19,2

	<i>Anarynchus alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu	x	LC	VU	x	x	VU	4	2	10,8
	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé		VU	NT		x	VU	3	2	10,8
	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	x	LC	VU	x	x	RE			346
	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe		LC	LC	x	x	CR	4	3	57,7
	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches		LC	LC	x	x	EN	4	3	43,3
	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux		LC	NT	x	x	EN	3	1	15,0
	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Echasse blanche	x	LC	LC	x	x	VU	2	1	12,4
	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	x	LC	LC	x	x	VU	2	2	10,2
	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	x	LC	NT	x	x	EN	3	2	6,7
	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	x	NT	EN	x	x	VU	4	2	2,8
	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois		VU	VU			VU	2	2	1,2
Fort	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	x	LC	VU	x	x				173
	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer		LC	LC	x	x	EN	3	2	16,5
	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin	x	LC	LC	x	x		1	1	10,8
	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1758	Héron pourpré	x	LC	LC	x	x				346
	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canard chipeau		LC	LC		x	EN	3	2	26,6
	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot		LC	LC	x		EN	3	2	7,9
	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse		LC	VU	x		VU	3	2	2,9
	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux		LC	EN	x		VU	4	2	2,5
	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune		LC	VU	x		EN	4	2	1,2
	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe		LC	VU	x		VU	3	2	1,1

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

DO : Espèce inscrite à l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux » (2009)

LR UE : liste rouge européenne (2021)

LR Fr : liste rouge française des oiseaux reproducteurs de France métropolitaine (2016)

Prot.nat. : espèces protégées au niveau national (Arrêté du 29 octobre 2009)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des oiseaux migrateurs et hivernants de Bretagne (2015)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2015)

RB 29 : Responsabilité biologique départementale (en cours de développement)

Ind loc. : Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombre de mailles occupées en Bretagne)

Il est également intéressant de noter quatre espèces patrimoniales anciennement nicheuses sur le site :

- le Busard cendré (*Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)), espèce à enjeu très fort, dont les derniers indices de reproduction datent de 1986.
- La Barge à queue noire (*Limosa limosa* (Linnaeus, 1758)), espèce à enjeu fort pour laquelle des mesures de gestion sont effectuées sur le site pour maintenir voire étendre les surfaces favorables à sa reproduction. Celle-ci est observée chaque année en hivernage mais aucun indice de reproduction n'y a été détecté depuis 2000, bien que quelques individus en plumage nuptial aient été observés sur le site jusqu'en 2008.
- La Bergeronnette flavéole (*Motacilla flava flavissima* (Blyth, 1834)), espèce à enjeu fort dont les derniers indices de reproduction remontent à 2013.
- Le Blongios nain (*Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)), espèce à enjeu modéré dont le dernier cas de reproduction datent de 1999.

Deux espèces peuvent être considérées comme nicheuses anecdotiques, le Canard carolin (*Aix sponsa* (Linnaeus, 1758)), espèce introduite, et la Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798)) avec un mâle chanteur en 2015.

Avifaune migratrice

222 espèces migratrices régulières (cf annexe 5) dont 78 peuvent être considérées comme patrimoniales, avec :

- 2 espèces à enjeu majeur
- 4 espèces à enjeu très fort
- 17 espèces à enjeu fort
- 55 espèces à enjeu modéré.

Les espèces à enjeu majeur à fort sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	S.I	DO	LR UE	LR Fr	Prot nat	ZNIE FF	LR Bzh	RB Bzh
Majeur	<i>Puffinus mauretanicus</i> Lowe, 1921	Puffin des Baléares		x	CR	VU	x	x	LC	4
	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Phragmite aquatique	x	x	VU	VU	x	x	VU	3
Très fort	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire			NT	VU		x	NT	4
	<i>Anarynchus alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu		x	LC	VU	x	x	VU	4
	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling	x		LC	LC	x	x		4
	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé			VU	NT		oui	VU	3
Fort	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle lusciniôide			LC	EN	x	x	CR	5
	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Plongeon imbrin		x	LC		x	x	VU	5
	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Spatule blanche		x	LC		x	x	EN	5
	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	x	x	LC	LC	x			4

<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand gravelot			LC	VU	x	x	VU	4
<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'été			LC	VU		x	CR	4
<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré		x	LC		x	x	CR	4
<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Harle huppé			NT	LC	x	x	NT	4
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette		x	LC		x		EN	3
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu			LC	VU				3
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux			LC	NT	x	x	EN	2
<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Echasse blanche		x	LC	LC	x	x	VU	2
<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain		x	LC	EN	x	x		
<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée		x	LC	VU	x	x		
<i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	Pluvier guignard		x	LC	NT	x	x		
<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Macareux moine			EN		x	x		
<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1760)	Pétrel fulmar			VU		x	x		

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

S.I. : seuil international atteint par l'espèce

DO : Espèce inscrite à l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux » (2009)

LR UE : liste rouge européenne (2021)

LR Fr : liste rouge française des oiseaux de France métropolitaine de passage (2016)

Prot.nat. : espèces protégées au niveau national (Arrêté du 29 octobre 2009)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des oiseaux migrateurs et hivernants de Bretagne (2015)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2015)

Concernant le Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*), Bargain (*in* collectif, 2008) estime que de 1 à 10 % de la population mondiale de Phragmite aquatique transitent par la baie d'Audierne chaque année, soit entre 280 et 4000 individus, à la faveur du modèle appliqué pour le nombre d'individus en transit/nombre d'individus capturés. La baie est l'un des 3 sites prioritaires nationaux identifiés pour l'accueil de l'espèce en halte migratoire (Julliard *et al.*, 2006 *in* Provost *et al.*, 2011) alors que la France constitue le principal couloir de migration post-nuptiale vers les quartiers hivernants en Afrique. On note toutefois une baisse sensible du nombre d'individus depuis 2010 (Guyot *et al.*, 2017), mais une amélioration en 2019 (Guyot & Ernst, 2019).

La population de Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*) est estimée entre 20 000 à 70 000 individus en halte migratoire post-nuptiale chaque année (1 à 3% de la population nord-ouest européenne). Les oiseaux capturés en migration à la station de baguage de Trunvel proviennent principalement des îles britanniques (Bargain & Henry, 2005). Le chiffre est estimé à partir d'un modèle appliqué pour le nombre d'individus en transit/nombre d'individus capturés. Les suivis réalisés depuis 1988 à la station de Trunvel montrent des effectifs migrateurs post-nuptiaux globalement stables malgré des variations interannuelles (Guyot *et al.*, 2017).

58 espèces migratrices occasionnelles peuvent également être notées sur le site (cf annexe 4).

Par ailleurs, 3 espèces migratrices introduites peuvent également être occasionnellement observées sur le site : la Bernache du Canada (*Branta canadensis* (Linnaeus, 1758)), l'Erismature rousse (*Oxyura jamaicensis* (Gmelin, 1789)) et l'Ibis sacré (*Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790)).

Avifaune hivernante

145 espèces hivernantes sont connues sur le site (cf annexe 6) dont 47 peuvent être considérées comme patrimoniales, avec :

- 6 espèces à enjeu très fort
- 14 espèces à enjeu fort
- 27 espèces à enjeu modéré

Le tableau ci-dessous présente les espèces à enjeu fort et très fort.

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	S.I	DO	LR UE	LR Fr	Prot nat.	ZNI EFF	LR Bzh	RB Bzh
Très fort	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Plongeon imbrin		x	LC	VU	x	x	VU	5
	<i>Anarynchus alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu		x	LC	VU	x	x	VU	4
	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Grèbe à cou noir			VU	LC	x	x	LC	4
	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire			NT	VU		x	NT	4
	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling	x		LC	LC	x	x		4
	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé			VU	NT		x	VU	3
Fort	<i>Puffinus mauretanicus</i> Lowe, 1921	Puffin des Baléares		x	CR		x	x	LC	4
	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	x	x	LC	LC			LC	4
	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette			VU	LC		x	EN	4
	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux			LC	EN	x		VU	4
	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie			VU			x		4
	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette		x	LC	LC	x		EN	3
	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin			VU	LC		x	EN	3
	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet			VU	LC		x	VU	3
	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu			LC	VU				3
	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou		x	NT		x	x		
	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand gravelot			LC	VU	x	x	VU	
	<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse brune			VU	EN				
	<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Macareux moine			EN		x	x		
<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pétrel fulmar			VU		x	x			

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

S.I. : seuil international atteint par l'espèce

DO : Espèce inscrite à l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux » (2009)

LR UE : liste rouge européenne (2021)

LR Fr : liste rouge française des oiseaux de France métropolitaine de passage (2016)

Prot.nat. : espèces protégées au niveau national (Arrêté du 29 octobre 2009)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des oiseaux migrateurs et hivernants de Bretagne (2015)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2015)

Par ailleurs 25 espèces peuvent être considérées comme hivernantes occasionnelles sur le site (cf annexe 5).

(b) Invertébrés

Les données issues des bases de données du GRETIA, de Bretagne vivante, de Faune Bretagne ainsi que d'études réalisées sur le site font état de 903 espèces continentales, dont :

- 39 odonates
- 156 lépidoptères
- 28 orthoptères
- 214 arachnides
- 27 hétéroptères aquatiques
- 279 coléoptères
- 160 autres espèces

De plus, les données issues de la base de données Quadrige de l'Ifremer (données disponibles au 28/03/2024), font état de 100 espèces marines sur le site, dont 15 annélides, 4 cnidaires, 42 crustacés, 5 échinodermes, 30 mollusques, 1 németrien, 2 porifères et 1 urochordé.

• Invertébrés continentaux

Odonates

39 espèces d'odonates ont été identifiées sur le site (cf annexe 7) dont une peut être considérée comme à enjeu très fort et une autre à enjeu fort (cf tableau ci-après).

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DH FF	LR UE	LR Fr	LR Bzh	ZNIEFF	RB Bzh	Ind loc.
Très fort	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Agrion joli		LC	VU	EN	x	4	5,2
Fort	<i>Aeschna isoceles</i> (O.F. Müller, 1767)	Aeschna isocèle		LC	LC	EN	x	3	15,7

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : liste rouge européenne (2009)

LR Fr : liste rouge française des odonates de France métropolitaine (2016)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des odonates de Bretagne (2019)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2019)

Ind loc. : Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombre de mailles occupées dans le grand-Ouest), Atlas des libellules de Bretagne à la Vendée (2023)

Il est également intéressant de noter la présence du Leste dryade (*Lestes dryas* Kirby, 1890), de l'Aesche isocèle (*Aeschna isocetes* (O.F. Müller, 1767)) et du Sympétrum de Fonscolombe (*Sympetrum fonscolombii* (Selys, 1840)) qui sont toutes les trois des espèces peu communes en Bretagne.

Lépidoptères

156 espèces de lépidoptères ont été observées sur le site, dont 48 rhopalocères et 108 hétérocères (cf annexe 8).

4 espèces peuvent être considérées comme à enjeu fort et une à enjeu modéré. Les espèces à enjeu fort sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DH FF	LR UE	LR Fr	Prot nat.	ZNI EFF	LR Bzh	RB Bzh	Ind loc.
Fort	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté		LC	NT		x	EN	3	9,3
	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des Potentilles		LC	LC		x	EN	3	13,6
	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym		LC	LC		x	EN	3	15,4
	<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré		LC	LC		x	EN	3	29,5

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : liste rouge européenne (2010)

LR Fr : liste rouge française des odonates de France métropolitaine (2012)

Prot. Nat. : Espèce protégée à l'échelle nationale (2007)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des rhopalocères de Bretagne (2018)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2018)

Ind loc. : Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombre de mailles occupées dans le grand-Ouest), Atlas des papillons diurnes de Bretagne (2017)

Il est également intéressant de noter que l'Hespérie des Potentilles (*Pyrgus armoricanus* (Oberthür, 1910)) est en limite septentrionale d'aire de répartition.

De plus, l'Agreste (*Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758)) est une espèce xérothermophile et peut donc être associé, sur le site, aux milieux dunaires et landes sur serpentine.

Orthoptères

28 espèces ont été identifiées sur le site (cf annexe 9). Ce groupe dispose actuellement de peu de listes de référence pour l'évaluation des statuts de rareté et de menace des espèces. Toutefois, les informations disponibles permettent de mettre en évidence 9 espèces d'intérêt, dont :

- 2 espèces à enjeu très fort
- 2 espèces à enjeu fort
- 5 espèces à enjeu modéré

Les espèces à enjeu très fort et fort sont présentées dans le tableau ci-après.

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	LR Fr	LR D.N	Ind. loc.	Déterminantes Bzh
Très fort	<i>Pseudochorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	Criquet palustre	3	1	17,04	Espèce très localisée et caractéristique des zones humides
	<i>Chortippus armoricanus</i> (Defaut, 2015)	Criquet des Ajoncs	2	1	5,21	Espèce localisée et caractéristique des landes littorales et intérieures
Fort	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	Conocéphale des Roseaux	3	2	1,76	Espèce caractéristique des zones humides
	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	Sténobothre nain	4	2	10,55	Espèce localisée, xérophile et caractéristique des pelouses et landes rases

LR Fr : Les orthoptères menacés en France - liste rouge nationale et listes rouges par domaine biogéographique (2004). 1 : espèces proches de l'extinction ou déjà éteintes / 2 : espèces fortement menacées d'extinction / 3 : espèces menacées, à surveiller / 4 : espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances.

LR D.N : Les orthoptères menacés en France - liste rouge nationale et listes rouges par domaine biogéographique (2004) – domaine néomoral

Ind loc. : Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombre de mailles occupées en Bretagne). Atlas de répartition provisoire des orthoptères, phasmes, mantes et forficules de Bretagne (2020)

Déterminantes Bzh : Critères liés à la liste provisoire des espèces déterminantes d'orthoptères de Bretagne (1999) - Chevrier *et al.* 2004.

Arachnides

214 espèces ont été identifiées sur le site (cf annexe 10). Deux d'entre elles sont présentes dans la liste rouge des Araignées de métropole (2023) dans la catégorie en danger (EN) : *Drepanotylus uncatu*s (O. Pickard-Cambridge, 1873) et *Dysdera fuscipes* Simon, 1882 ; ainsi qu'une autre espèce dans la catégorie quasi-menacée (NT) : *Silometopus ambiguus* (O. Pickard-Cambridge, 1906).

*Drepanotylus uncatu*s se trouve de plus en limite d'aire de répartition sur le territoire et caractéristique des milieux tourbeux. *Dysdera fuscipes* peut, quant à elle, être considérée comme un indicateur de la qualité des milieux dunaires.

La présence de 4 autres espèces doit également être notée (P. Devogel, comm. Pers.) :

- *Attulus saltator* (O. Pickard-Cambridge in Simon, 1869) qui est rarement observée en Bretagne,
- *Micaria fulgens* (Walckenaer, 1802), espèce thermophile et rarement observée en Bretagne,
- *Phlegra bresnieri* (Lucas, 1846) qui se situe en limite d'aire de répartition et qui est associée aux habitats dunaires et de galets,
- *Xerolycosa miniata* (C.L. Koch, 1834), espèce associée aux milieux dunaires rarement observée en Bretagne.

Hétéroptères aquatiques

Pour les 12 stations inventoriées en 2022 sur le territoire concerné par le projet de RNR, 27 espèces ont été recensées (cf annexe 11). L'étang de Trunvel regroupe à lui seul 17 espèces et présente de ce fait une diversité remarquable. A l'inverse, aucune espèce n'a été trouvée à Prat ar Hastel sans qu'aucune explication ne puisse être proposée à ce jour.

Ce groupe taxonomique ne dispose actuellement pas de liste de référence pour l'évaluation des statuts de rareté et de menace des espèces. L'analyse du peuplement a donc été réalisée à dire d'expert (Compte-rendu de prospections hétéroptères aquatiques 2022-03_Philippe LONCLE). 4 espèces sont donc à noter pour leur rareté à l'échelle de la Bretagne : *Cymatia coleoprata* (Fabricius, 1777), *Gerris asper* (Fieber, 1860), *Gerris odontogaster* (Zetterstedt, 1828) et *Microvelia pygmaea* (Dufour, 1833).

Coléoptères

279 espèces ont été observées sur le site (cf annexe 12). La présence de 8 d'entre elles doit être notée (P. Devogel, comm. Pers.) :

- *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758) qui se situe en limite d'aire de répartition et qui bénéficie d'une protection à l'échelle nationale.
- *Gracilia minuta* (Fabricius, 1781), espèce thermophile rarement observée en Bretagne.
- *Harpalus picipennis* (Duftschmid, 1812), espèce caractéristique des milieux dunaires rarement observée en Bretagne.
- *Odacantha melanura* (Linnaeus, 1767), espèce caractéristique des roselières, rarement observée en Bretagne.
- *Spermophagus sericeus* (Geoffroy in Fourcroy, 1785), espèce caractéristique des milieux dunaires rarement observée en Bretagne.
- *Coccinella magnifica* Redtenbacher, 1843, espèce myrmécophile rarement observée en Bretagne.
- *Carabus cancellatus* Illiger, 1798 qui peut être considérée comme un indicateur de la qualité des zones humides.
- *Paradromius longiceps* (Dejean, 1826) qui peut être considérée comme un indicateur de la qualité des roselières.

Autres espèces

- Isopodes : 4 espèces dont *Armadillidium album* Dollfus, 1887 qui peut être considérée comme indicateur de la qualité des habitats de laisses de mer.
- Diptères : 41 espèces
- Forficules : 2 espèces
- Hémiptères (hors hétéroptères aquatiques) : 57 espèces
- Hyménoptères : 12 espèces dont *Myrmica sabuleti* Meinert, 1861 qui peut être considérée comme indicateur de la qualité des habitats dunaires.
- Mante : 1 espèce
- Mollusques : 41 espèces
- Myriapodes : 1 espèce
- Phasmes : 1 espèce

Ces 160 espèces sont listées en annexe 13.

• Invertébrés marins

Les invertébrés marins ne disposent actuellement pas de liste de référence pour l'analyse des statuts de rareté et de menace des espèces. Les 100 espèces recensées sont listées en annexe 14.

L'Huître creuse (*Magallana gigas*), espèce exotique envahissante avérée est connue sur le site.

(c) Amphibiens/reptiles

Amphibiens

10 espèces ont été identifiées sur le site (cf annexe 15), dont 6 peuvent être considérées comme patrimoniales à enjeu modéré.

Reptiles

6 espèces ont été identifiées sur le site (cf annexe 14), dont 1, la Vipère péliade (*Vipera berus* (Linnaeus, 1758)) peut être considérée comme patrimoniale à enjeu fort (cf tableau ci-après).

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	LR UE	LR Fr	Prot nat.	LR Bzh	ZNIEFF FF	RB Bzh
Fort	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade		LC	VU	x	EN	x	4

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : Liste rouge européenne (2009)

LR Fr : Liste rouge française des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (2015)

Prot nat. : Liste des espèces protégées en France (2021)

ZNIEFF : Espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des odonates de Bretagne (2015)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2017)

(d) Mammifères

Mammifères terrestres

Les bases de données du GMB, de Bretagne vivante, de Faune Bretagne et de l'étude génétique SpyGen 2023, font état de 24 espèces (cf annexe 16) donc 5 peuvent être considérées comme patrimoniales, avec :

- 1 espèce à enjeu majeur
- 2 espèces à enjeu très fort
- 2 espèces à enjeu modéré

3 espèces exotiques envahissantes sont également recensées sur le site : le Vison d'Amérique (*Mustela vison* Schreber, 1777), le Ragondin (*Myocastor coypus* (Molina, 1782)) et le Rat musqué (*Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)).

Mammifères marins

La base de données Faune Bretagne fait état de 9 espèces observées sur le site (cf annexe 16). Toutefois le périmètre maritime du projet se limite à l'estran. Les mammifères marins qui y sont observés sont donc généralement associés à des échouages et ne sont donc pas analysés ici. En revanche, le Phoque gris fréquente occasionnellement le site. Cette espèce peut être considérée comme à enjeu très fort.

Le tableau ci-après présente les mammifères terrestres et marins à enjeu majeur et très fort.

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DH FF	LR UE	LR Fr	Prot nat.	LR Bzh	ZNI EFF	RB Bzh	Ind loc.
Mammifères terrestres										
Majeur	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Campagnol amphibie		VU	NT	x	NT	x	3	1,2
Très fort	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	x	NT	LC	x	LC	x	3	1,3
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand Rhinolophe	x	NT	LC	x	EN	x	4	1,6
Mammifères marins										
Très fort	<i>Halichoerus grypus</i> (Fabricius, 1791)	Phoque gris	x	LC	NT	x	VU	x	4	-

Enjeu : Résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : Liste rouge européenne (2007)

LR Fr : Liste rouge française des mammifères de France métropolitaine (2017)

Prot nat. : Liste des mammifères terrestres protégés en France (2007)

ZNIEFF : Espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des mammifères de Bretagne (2015)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2017)

Ind loc. : Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombre de mailles occupées dans le grand-Ouest), Atlas des mammifères de Bretagne (2015)

(e) Poissons

Poissons d'eau douce et migrateurs

A partir des données issues de Bretagne vivante et de l'analyse d'ADN environnemental réalisée en 2023 dans deux étangs du site (SpyGen, 2023), 8 espèces ont pu être identifiées sur le site (cf annexe 17). Deux d'entre elles, présentées dans le tableau ci-dessous, peuvent être considérées comme patrimoniales, avec :

- 1 espèce à enjeu majeur
- 1 espèce à enjeu fort

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	LR UE	LR Fr	Prot nat.	LR Bzh	ZNI EFF	RB Bzh
Majeur	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguille d'Europe		CR	CR		CR	x	4
Fort	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Brochet		LC	VU	x	NT	x	3

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : liste rouge européenne (2011)

LR Fr : liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2019)

Prot nat. : liste des poissons d'eau douce protégés en France (2007)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des poissons d'eau douce de Bretagne (2017)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2015)

Par ailleurs, une espèce introduite a été observée sur le site, la Truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792)). De plus, le Gambusie (*Gambusia holbrooki* Girard [ex Agassiz], 1859),

observé pour la première fois en 2025 sur le site, est inscrit sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes de l'union européenne.

Poissons marins

Les données issues de Bretagne vivante, notamment liée à l'observatoire de l'estran, ont permis d'identifier 4 espèces de poissons strictement marins (cf annexe 17). Ce groupe taxonomique dispose de peu de listes de référence pour l'analyse des statuts de rareté et de menace des espèces.

2.3 - Patrimoine archéologique et historique

Les **traces de l'occupation humaine** de la baie d'Audierne sont nombreuses et diverses. Le patrimoine préhistorique datant du Paléolithique est très présent sur ce territoire et atteste la présence de l'Homme depuis presque 300 000 ans (Chatain R, 2018). Tumulus, dépôts coquilliers, menhirs enfouis sous les sables de la plaine dunaire, céramiques, tombeau sont autant de signes qui témoignent de l'intérêt scientifique de la baie d'Audierne du point de vue préhistorique. Un musée lui était d'ailleurs dédié à Penmarc'h mais a été fermé au public en 2020 pour des raisons de sécurité, et le site de Menez Degran à Plouhinec (en dehors du périmètre du site) est un lieu majeur pour la recherche archéologique.

Figure 15 : Menhir de Kerharo et tumulus de la pointe de la Torche (Plomeur)

Aux petites communautés de chasseurs-cueilleurs vivant de la chasse, la pêche et de la récolte de coquillages, se sont succédées des communautés installées à proximités des marais et vivant de la culture.

Des vestiges de l'époque Gallo-romaine et du Moyen-Age peuvent également être ponctuellement retrouvés sur le territoire.

L'**activité agricole** se limite à un pâturage extensif de la palud jusqu'au 19^{ème} siècle. Un important projet de drainage mené au début du 20^{ème} siècle pour maîtriser les niveaux d'eau du Loc'h ar Stang, de Trunvel et de Kergalan, a permis de valoriser les terres émergées et d'y développer des cultures. Les ouvrages associés au drainage des terres sont encore visibles aujourd'hui (canaux, aqueduc,

pont). L'aqueduc fut détruit en 1967 par des tempêtes (cf figure 16) et ne sera jamais restauré. Néanmoins, des brèches seront régulièrement ouvertes au niveau de l'étang de Trunvel ou de Kergalan pour abaisser leurs niveaux d'eau.

Figure 16 : Photographies aériennes au niveau de l'exutoire de Trunvel (entouré en rouge), à gauche le 21/06/61 le canal d'évacuation est bien visible et à droite le 11/07/67, le canal est ensablé. Source : IGN

L'activité agricole a ainsi peu à peu façonné la plaine dunaire et l'on y devine encore le réseau de talus qui bordait les parcelles étroites. La présence d'étangs piscicoles et cynégétiques, les anciens ouvrages hydrauliques et les canaux de drainage témoignent d'**aménagements humains** dont l'aspect actuel des lieux est indissociable.

De nombreux éléments de **patrimoine religieux** (églises, chapelles, calvaires, etc.) et **culturels** (moulin, maisons traditionnelles, tour, châteaux, manoirs, etc.) peuvent également être retrouvés sur le site et à proximité directe.

L'**occupation allemande** a laissé en héritage nombre de blockhaus et autres Tobrouks. Le plus remarquable reste le Concasseur de Tréguennec qui a servi à exporter plus d'un million de tonnes de galets.

3 - Gestion, usages et menaces

3.1 - Gestion et usages

3.1.1 - GESTION DES ESPACES NATURELS

Le site des Dunes et paluds bigoudènes ou plus largement la baie d'Audierne a été reconnue très tôt pour son patrimoine naturel exceptionnel. Pour exemple, Bretagne vivante lui consacre dès 1969 un numéro de sa revue Penn ar Bed.

Les premières actions de **gestion de l'accueil du public** se mettent en place à la pointe de la Torche avec la création de stationnements en 1980. La protection des dunes et des milieux humides prend progressivement plus d'importance à cette même époque avec la création de l'Association de promotion du Pays Bigouden (1986).

En parallèle, le Conservatoire du littoral commence ses **acquisitions** sur le site en 1985 et est aujourd'hui propriétaire de plus de 770 ha sur les sites de la baie d'Audierne et des marais de la Joie et de Lescors. En 2000, le SIVU de la baie d'Audierne regroupant 4 communes du Pays bigouden sud, est créée pour gérer les terrains du Conservatoire du littoral et se dote d'une équipe dédiée à cette mission. Il assure en 2007 la concertation pour l'élaboration du **Document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 « Baie d'Audierne »**. Validé en 2010, le DOCOB constitue à ce jour le seul plan de gestion qui apporte une vision d'ensemble du site.

Les actions de gestion prévues dans le DOCOB et mises en œuvre pour le maintien des milieux et des populations d'espèces sont les suivantes :

- Gestion de la fréquentation (mise en place d'enclos de protection matérialisant les milieux sensibles, stationnement, etc.) ;
- Intervention sur les espèces végétales invasives ;
- Protection de la reproduction de certaines espèces sensibles ;
- Actions de génie écologique pour la préservation d'espèces et de milieux naturels ;
- Gestion pastorale ;
- Mise en œuvre de la réglementation communale harmonisée réglementant les usages sur les terrains Conservatoire du littoral et ceux du Conseil départemental (CCPBS) ;
- Politique de découverte, éducation et sensibilisation aux enjeux de biodiversité.

Les élus, conscients de l'intérêt d'aller plus loin dans la mutualisation et la gestion de cette grande entité naturelle – mais également de 1 200 ha d'espaces naturels supplémentaires sur d'autres sites du territoire – décident de **porter la gestion des espaces naturels au niveau communautaire**. De ce fait, la CCHPB assure cette mission depuis 2007 et la CCPBS depuis 2013 reprenant alors l'équipe et les missions du SIVU de la baie d'Audierne. Le site Natura 2000 de la baie d'Audierne est donc aujourd'hui porté par la CCPBS en lien avec la CCHPB.

Les deux EPCI portent la compétence protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines dans les périmètres Natura 2000 et Espaces Naturels Sensibles (Département et Conservatoire du littoral). Le Syndicat mixte Ouesco intervient sur les zones humides en dehors de ces périmètres.

La gestion des espaces naturels se fait également au travers des **conventions d'usages** du Conservatoire du littoral avec un certain nombre d'acteurs, en particulier les agriculteurs. Par ailleurs, une stratégie agroécologique a été définie en 2012 pour le site Natura 2000 de la baie d'Audierne et concerne notamment les parcelles du Conservatoire du littoral. Le document identifie, par secteur, les modalités des pratiques agropastorales adaptées à la conservation d'habitats et d'espèces patrimoniales tout en prenant en compte les contraintes liées à l'élevage. En 2018, un stage au sein de la CCHPB a permis d'élaborer un document précisant la gestion pour les 160 ha de terrains du Conservatoire du littoral.

Une convention du Conservatoire du littoral pour la collaboration et le suivi scientifique par le baguage d'oiseaux est établie avec Bretagne Vivante.

Cependant, au regard des grandes étendues sableuses ou marécageuses, la **non-intervention** est, par la force des choses, en place sur de nombreux secteurs du site. Les collectivités gestionnaires n'ont pas pour ambition d'intervenir à tout prix dans les processus naturels, au contraire. Il apparaît plus légitime pour un gestionnaire d'intervenir lorsqu'un milieu est dégradé par un usage humain, ou lorsque la fonctionnalité du milieu vis-à-vis de certaines espèces est réduite ou altérée par une pratique humaine. Cependant, lorsque les enjeux naturalistes et les objectifs de conservation fixés par les documents de gestion l'imposent, les gestionnaires agissent pour **maintenir les conditions écologiques favorables au milieu ou au bon déroulement des cycles biologiques des espèces concernées**.

C'est le cas de certains milieux naturels humides comme le Loc'h ar Stang, le marais de Lescors ou celui de La Joie qui sont aujourd'hui dans un état de conservation altéré (discontinuités écologiques, atterrissement, etc.) et qui nécessitent un programme d'actions pour rétablir leur bonne fonctionnalité.

Les étangs de Trunvel et de Kergalan forment un complexe humide avec de forts enjeux de conservation qui sont étroitement liés aux niveaux d'eau qui influencent la qualité et la superficie des roselières et prairies humides associées. La bonne conservation de ces milieux nécessitera de mieux **comprendre le fonctionnement et l'évolution des étangs et de questionner leurs trajectoires souhaitées au regard des enjeux du site**.

3.1.2 - USAGES SUR LE SITE

L'**essor du tourisme** et du temps libre a considérablement fait évoluer la fréquentation humaine en baie d'Audierne. Les activités humaines sur le site sont, à l'instar de nombreux littoraux, diverses, nombreuses et saisonnières. Peu de secteurs de la baie d'Audierne ne sont pas fréquentés par l'Homme, excepté le cœur des zones humides resté impénétrable. La pression de fréquentation est surtout importante sur la frange littorale puisque les grandes plages de la baie d'Audierne attirent un public toujours plus nombreux. La possibilité d'y pratiquer les **sports de glisse** sous toutes ses formes renforce l'attractivité de cette côte. La fréquentation de la plage est continue sur l'année et connaît un pic estival. Les secteurs les plus fréquentés sont la pointe de la Torche (Plomeur), Tronoën (Saint Jean Trolimon) et Penhors (Pouldreuzic).

Plus en retrait, les prairies dunaires font l'objet d'une fréquentation beaucoup moins importante et plus diluée sur ces grands espaces. Les zones humides étaient jusqu'en 2009 exploitées par plusieurs **chaumiers**. Concurrencée par le chaume du sud de la France et d'Asie, cette activité n'existe plus

depuis cette date. On y retrouve également des **activités agricoles**, en particulier l'élevage. Le pâturage (bovin et ovin) est la seule activité s'exerçant au cœur des zones humides toute l'année. Les grandes zones humides en baie d'Audierne sont peu accessibles du fait de leur configuration (ceinture de roseaux, saulaie) et leur dangerosité (trou de vase et canaux). Elles ne sont fréquentées qu'en pourtour par les randonneurs, les pêcheurs, les chasseurs et les naturalistes.

Le tableau ci-dessous liste les grands usages que l'on peut retrouver dans le site de la baie d'Audierne. Les activités évoluant constamment avec l'apparition régulière de nouvelles pratiques, il ne peut donc être complètement exhaustif. Certaines de ces activités, les plus caractéristiques du site, sont ensuite détaillées.

Type d'activité	Usages
Prélèvement de ressources naturelles	Chasse Pêche de loisir (en mer et eau douce) Pêche à pied professionnelle (Tellines) Cueillette Prélèvements sauvages de sédiments
Gestion et éducation à l'environnement	Animations nature Protection des milieux et des espèces Gestion, actions de génie écologique Surveillance du site Suivis scientifiques / station de baguage Entretien des réseaux de canaux Nettoyage manuel de l'estran
Sports et loisirs	Balnéotourisme Sports de glisse (surfs et dérivés, planche à voile, kitesurf, etc.) Navigation et plaisance Sports terrestres à traction éolienne (char à voile, cerf-volant, etc.) Loisirs subaquatiques Golf
Circulation motorisée	Motos et quads Véhicules des telliniers (DPM) Entretien/gestion et ramassages mécanisés sur grève Modélisme ULM et autres aéronefs
Agriculture	Maraichage Elevage Bulbiculture, céréaliculture et autres cultures
Évènementiel	Compétitions (sports de glisse notamment) Rave parties et fêtes Rassemblements évangéliques
Accueil touristique	Hébergements touristiques Cours liés aux activités nautiques et location de matériel Surveillance de baignades Commerces Stationnements
Randonnées	Pédestre Équestre Cycliste
Autres activités	Sexotourisme Camping sauvage Dépôts de déchets Echouage / pollution maritime

Les activités de chasse et de pêche de loisirs

La chasse est surtout pratiquée sur les dunes et dans les marais, et est quasiment absente de l'estran. Elle concerne principalement le lapin dans les dunes, et quelques oiseaux d'eau dans les marais. Cette activité est cadrée par des conventions sur les terrains du Conservatoire du littoral et elle est réservée au propriétaire et ses ayants-droits sur les terrains privés.

La pêche de loisir se pratique sur les étangs et quelques cours d'eau ainsi que sur l'estran (surfcasting). Elle est réservée au propriétaire et ses ayants-droits sur les étangs de Trunvel et Kergalan et encadrée par une convention entre le Conservatoire du littoral et l'AAPPMA locale pour l'étang de St-Vio.

Ces activités de prélèvement existent depuis de nombreuses années en baie d'Audierne et, au regard de la faible pression exercée, ne semblent pas être en inadéquation avec les objectifs de conservation.

La pêche à la telline

En baie d'Audierne, il existe une activité peu répandue ailleurs. Il s'agit de la pêche professionnelle à la telline (*Donax trunculus*). Elle se pratique sur l'estran, toute l'année, à marée basse. Les pêcheurs tirent une drague à dos et récoltent ainsi les bivalves. L'accès des professionnels en véhicules motorisés au site de pêche se fait par le cordon dunaire dans le cadre d'une dérogation préfectorale.

Suivis scientifiques / station de baguage

Un important suivi ornithologique est effectué durant la période de migration post-nuptiale au sein de la roselière de Trunvel (station de baguage de Bretagne vivante). Elle est ouverte depuis 1988. Chaque année, un suivi de 4 mois y est effectué (début juillet à fin octobre), et permet d'alimenter 3 programmes de recherche (cf paragraphe 4.2.1 Acquisition de connaissances).

D'autres programmes de suivis sont réalisés sur le site : suivi de la reproduction du Gravelot à collier interrompu et du Guêpier d'Europe, comptages wetlands, POP reptile, POP amphibien, etc.

La section locale bénévole de Bretagne vivante assure également un rôle important dans l'acquisition de connaissances dites opportunistes (non collectées dans le cadre d'un protocole de suivi).

Activités de loisirs

Le site est le support de nombreux sports de nature, notamment sports de glisse qui participent fortement à l'identité du territoire. Elles se pratiquent aussi bien de manière encadrée (écoles, club) qu'individuelle. Ces activités se sont rapidement développées et diversifiées. Elles se pratiquent toute l'année, avec un pic de fréquentation allant du printemps au début de l'automne, sur l'ensemble de la frange littorale de la baie d'Audierne qui jouit d'une réputation nationale voire internationale, en raison de la qualité de ses vagues et la constance de ses vents. Leurs représentants locaux se positionnent comme relai de la sensibilisation à l'environnement.

Un point de vigilance doit être apporté à la pratique de certaines activités de loisirs qui, à certaines périodes, menacent la quiétude du site et des espèces associées, telle que le vol de planeurs ultra-légers motorisés (ULM) au-dessus des zones de repos et de halte des oiseaux par exemple, ou encore la pratique du char à voile sur le bas de plage lors de la période de regroupement post-nuptiaux de certaines espèces.

La bulbiculture

En périphérie du site, des bulbiculteurs exploitent des terrains sablonneux pour y faire pousser des plantes à bulbes (jacinthe, tulipes, iris, etc.). Cette activité agricole est sujette à questionnement du fait de ses pratiques culturales, en particulier de l'usage des pesticides et de son impact sur les milieux naturels voisins.

Le sexotourisme

Le sexotourisme (usagers venant exclusivement pour des pratiques sexuelles) est très présent sur les dunes et les paluds de Tréguennec et Tréogat. Cette pratique, au-delà des problématiques d'exhibitionnisme et de sécurité pour les autres usagers, engendre une destruction de l'habitat dunaire et un dérangement de l'avifaune.

3.2 - Menaces

3.2.1 - MENACES POUR LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE

(a) Cordon de galets pléistocène

L'ancien cordon de galets est en partie intégré à l'arrêté liste départemental des sites d'intérêt géologique. Il dispose ainsi, pour le secteur concerné, d'une protection réglementaire forte permettant d'interdire toute action pouvant altérer ou dégrader le site et le matériel géologique qu'il contient.

La fréquentation du littoral reste toutefois une menace pour le site, notamment pour le secteur situé sur la plage (prélèvement de galets, érosion liée au piétinement de la falaise) qui est par ailleurs soumis à érosion importante notamment lors des épisodes de tempêtes.

Tableau 7 : Menaces et besoins de protection du site de Ru-Vein. Source : INPG

Critère	Légende	BRE0114
Intérêt patrimonial	Nombre d'étoiles obtenues	2
Vulnérabilité naturelle	0 : aucune / 3 : extrême	2
Menaces anthropiques	0 : aucune / 3 : extrême	1
Protection effective	0 : protection maximale / 3 : aucune	0
Total / 12	0 : aucun danger / 12 : nécessite une protection importante	5

D'après le système de notation de l'INPG, le site ne nécessite pas particulièrement de protection supplémentaire. En outre, les menaces principales qui s'exercent sur le site sont d'origine naturelle et ne peuvent donc pas être ciblées par des mesures de protection. Une vigilance reste donc à avoir en ce qui concerne les menaces d'origine anthropique afin de réduire au maximum leur incidence sur la conservation de ce patrimoine.

Une attention spécifique devra également être portée si des actions de gestion de la végétation sont menées dans le cadre, par exemple, d'actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes qui sont bien présentes sur la zone. En effet, lors des interventions à proximité des fronts de taille, il faudra veiller à éviter toute atteinte à la conservation du cordon pléistocène.

(b) *Serpentine*

Le site de Pontalan ne présente pas de de vulnérabilité particulière. La carrière, située en parcelle privée, n'est plus exploitée depuis 1981. Par ailleurs, le développement de la végétation y est ralenti par la présence de chrome dans les roches et donc dans le sol. Le site conserve ainsi un bon état général.

Tableau 8 : Menaces et besoins de protection de la carrière de Pontalan. Source : INPG

Critère	Légende	BRE0183
Intérêt patrimonial	Nombre d'étoiles obtenues	2
Vulnérabilité naturelle	0 : aucune / 3 : extrême	0
Menaces anthropiques	0 : aucune / 3 : extrême	0
Protection effective	0 : protection maximale / 3 : aucune	1
Total / 12	0 : aucun danger / 12 : nécessite une protection importante	3

Toutefois, il a été constaté en 2022 que des souches ont été poussées dans la carrière depuis ses bordures. Le caractère privé du site lui confère ainsi une forme de vulnérabilité liée à l'usage qui peut en être fait par ses propriétaires. La démarche d'animation foncière engagée pour l'intégration des parcelles concernées dans le périmètre de la future RNR n'a en outre pas permis d'obtenir l'accord des propriétaires.

L'inscription de ce site sur l'arrêté liste des sites d'intérêt géologique du Finistère lui confère toutefois une protection réglementaire liée à la préservation de ce patrimoine géologique. Cependant, cela ne permet pas d'assurer la protection des enjeux liés aux habitats naturels et à la flore qui s'exprime spécifiquement dans ce contexte géologique particulier.

(c) *Gisement de lithium*

L'exploitation éventuelle du gisement de lithium représenterait certes un intérêt économique, mais impliquerait nécessairement une perte de patrimoine : pour le patrimoine géologique par son extraction, et pour le patrimoine biologique par une destruction des habitats naturels ainsi que par une fréquentation et un dérangement importants liés à l'activité minière.

Aucune mesure n'a à ce jour été prise en faveur de l'exploitation du gisement. Toutefois, cette éventualité doit être relevée ici en tant que menace pour le site. Elle interviendrait par ailleurs en contradiction avec les différentes politiques menées en faveur de la protection de l'environnement en Pays bigouden. Elle risquerait ainsi de provoquer une fracture face à la population en ce qui concerne la cohérence des politiques territoriales et l'appropriation locale de l'outil « Réserve naturelle régionale ». A la différence des réserves naturelles nationales, les RNR ne sont pas compétentes pour réglementer ou interdire les activités minières et l'extraction de matériaux concessibles (article L.332-3 du Code de l'environnement). Toutefois, toute modification de l'état et l'aspect d'une réserve naturelle régionale est interdite par l'article L.332-9 du Code de l'environnement, sauf dans le cas d'autorisations spéciales accordées par le président du Conseil régional.

3.2.2 - MENACES POUR LE PATRIMOINE BIOLOGIQUE

(a) Evolution des habitats

A l'instar de nombreux sites naturels humides, autrefois accueillant du pâturage et donc disposant d'un moyen de pression durable pour **maintenir les milieux ouverts**, l'abandon de certaines pratiques agricoles sur ces secteurs réputés difficiles à exploiter aboutit à la modification progressive du milieu naturel. Les saulaies et fourrés de prunelliers succèdent aux dépressions humides lorsque les contraintes littorales (vent, embruns, pilonnage du sable) ne sont pas assez fortes. Ces zones arbustives sont souvent considérées moins intéressantes en termes de biodiversité.

La stratégie agro-pastorale portée dans le cadre de Natura 2000, notamment sur les parcelles du Conservatoire du littoral a néanmoins permis de remettre en place des pratiques agricoles extensives sur plus de 400 ha.

Depuis 2010, les services de l'Etat n'autorisent plus l'ouverture mécanique de brèches dans le cordon de galets pour assurer la **gestion des niveaux des étangs de Trunvel et Kergalan**. Cette pratique était autrefois réalisée pour assécher partiellement les étangs et permettait ainsi d'y établir certaines activités notamment agricoles sur les zones exondées. Elle avait été poursuivie par Bretagne vivante pour assurer le maintien des habitats favorables à l'accueil des passereaux paludicoles et notamment du Phragmite aquatique.

L'abandon de cette pratique conduit naturellement à une augmentation des niveaux d'eau dans les deux étangs et entraîne de ce fait une modification de la répartition des habitats naturels dans, et aux abords, des plans d'eau. La zone d'eau libre s'étend, repoussant la roselière vers les bordures des étangs au détriment des prairies humides de transition dont le recul est empêché par la présence de fourrés, de zones cultivées (cf figure 17) ou encore d'aménagements qui créent une rupture dans la continuité des espaces naturels.

Figure 17 : Orthophotographies aériennes de 2004 à gauche et 2024 à droite, à Crumini en bordure de l'étang de Kergalan. En jaune, la délimitation de la roselière en 2004 / en bleu, la délimitation de la prairie humide en 2004 / en transparence sur la photo de droite, la zone gagnée par la roselière au détriment de la prairie humide (© IGN)

(b) Changement climatique

La situation littorale du site des dunes et paluds bigoudènes le rend particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. L'augmentation de la fréquence des tempêtes hivernales, associées à de forts coefficients de marées et à des vents d'ouest, fragilise les cordons dunaires et de galets et amplifie l'**érosion du trait de côte**.

Figure 18 : A gauche, photo prise le 24/11/22 et à droite, le 25/11/22 ; avant et après des marées de coefficient 96 et 97 associées à des rafales de 83 km/h de Sud-Ouest. © Gregory Thomas, CCPBS.

La présence des étangs littoraux permanents et temporaires est liée à la **barrière naturelle** que représentent les cordons de galets et cordons dunaires face à l'écoulement des eaux. Leur fragilisation associée à de faibles apports sédimentaires, notamment sur la partie nord du site, pourrait à terme conduire à des évolutions importantes en termes de milieux naturels avec une régression, voire une disparition de certains étangs (Faye *et al.*, 2007).

Figure 19 : Percolation d'eau en aval du plan d'eau du Guélen (Plovan) au travers du cordon de galets en hiver

L'alimentation en eau des zones humides du territoire étant principalement liée à la pluviométrie et aux écoulements de surface, ces milieux sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques et aux **épisodes de sécheresse**. Cet effet est renforcé pour les zones humides temporaires, dont l'étendue et la période d'inondation influence directement leurs rôles fonctionnels pour la biodiversité : zones de reproduction pour les amphibiens et certaines espèces d'oiseaux, reposoirs, zones d'alimentation, etc.

Certaines activités humaines sur le site, notamment les pompages, amplifient ce phénomène. Le plus important étant le pompage de l'étang de St-Vio à Tréguennec qui peut atteindre 145 000 m³ certaines années pour l'irrigation de parcelles bulbicoles. Ce pompage fait actuellement l'objet de procédures de régularisation par les services de l'Etat et est donc de ce fait suspendu. De plus, le Conservatoire du littoral, propriétaire de l'étang de St-Vio, souhaite accompagner l'exploitant concerné vers un arrêt progressif de ce pompage.

Du fait de son contexte climatique, le site accueille à la fois des espèces animales et végétales à affinités septentrionales et méridionales. Les changements globaux ont toutefois des effets sur la

répartition des espèces et leurs cycles biologiques et peuvent donc conduire à un remplacement progressif des populations aujourd'hui connues sur le site. Les suivis effectués à la station de baguage de Trunvel depuis 1988 constituent une base de données considérable et permettent d'enregistrer les évolutions des populations ainsi que la modification de la phénologie de migration, qui devient plus précoce (Guyot *et al.*, 2018).

(c) **Espèces exotiques envahissantes**

La présence d'espèces invasives est un problème pour la préservation des habitats naturels, notamment aquatiques, et des espèces qui y sont inféodées.

Sur le site, 35 espèces invasives ont été identifiées, dont :

- 20 plantes vasculaires dont 10 invasives avérées et 10 potentielles. Quinze autres espèces à surveiller sont également notées.
- 6 phytoplanctons, *Pseudo-nitzschia multistriata*, *Fibrocapsa japonica*, *Heterosigma akashiwo*, *Alexandrium affine*, *Alexandrium leei*, *Alexandrium minutum*, *Karenia mikimotoi* et *Karenia papilionacea* ;
- 4 oiseaux dont les observations restent anecdotiques sur le site, le Canard carolin (*Aix sponsa*), la Bernache du Canada (*Branta canadensis*), l'Erismature rousse (*Oxyura jamaicensis*) et l'Ibis sacré (*Threskiornis aethiopicus*).
- 1 bivalve marin, l'Huître creuse (*Magallana gigas*)
- 3 mammifères, le Vison d'Amérique (*Neovison vison*), le Ragondin (*Myocastor coypus*) et le Rat musqué (*Ondatra zibethicus*) ;
- 1 poisson d'eau douce : la Truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*).

Ces espèces constituent des menaces pour la bonne conservation du site. En effet, bien souvent compétitrices, elles peuvent **remplacer les espèces autochtones** et ainsi **modifier les équilibres biologiques** en place.

En particulier, la Jussie se développe de manière très importante sur les étangs de Kergalan et de Trunvel, malgré les opérations d'arrachage manuel organisées dans le cadre de Natura 2000 en 2012.

(d) **Dégradation des habitats**

La forte **fréquentation** du site naturel, notamment en été et en particulier sur l'estran et entre les parkings et la plage, génère une dégradation, voire parfois une destruction des habitats naturels qui font l'objet d'une sollicitation trop importante.

Figure 20 : Exemple d'aménagements par bords pour la canalisation du public dans les dunes de Kermabec à Tréguennec

Les aménagements liés à la **canalisation du public** sur le site (ganivelles, monofils, etc.) sont généralement bien respectés par le public et permettent de préserver les habitats naturels. Toutefois, certains usagers, notamment les sexotouristes, continuent à fréquenter les dunes de manière erratique. Ils entretiennent ainsi un réseau de sentiers depuis les parkings et de siffle-vents (entailles dans le cordon dunaire) qui favorisent une érosion éolienne intense. Cette pratique est principalement localisée dans les dunes de Tréogat et de Tréguennec.

Figure 21 : Orthophotographie aérienne des dunes de Kermabec (IGN, 2021) laissant apercevoir l'important réseau de sentiers sur ce secteur.

Mais le renouvellement et l'implantation de nouveaux aménagements de canalisation du public entre le parking de Kermabec et l'étang de Trunvel a conduit à un report d'une partie de ces usagers vers le sud (Loc'h ar Stang, Vouden Lann).

Les activités agricoles et l'urbanisation en amont du bassin versant ont un impact sur la qualité des habitats naturels humides situés en aval du bassin versant. Une tendance à l'**eutrophisation** des milieux aquatiques est perceptible sur les étangs côtiers. Sur certains secteurs, la présence de **pesticides** dans les cours d'eau est importante sans que l'on ne puisse déterminer l'incidence de ces contaminations sur les milieux naturels et les espèces qu'ils abritent.

Dans certains secteurs, l'absence de protections fortes laisse observer une **extension progressive des parcelles agricoles sur les milieux naturels**. C'est le cas par exemple pour les landes sur serpentine de Ty Lann (Plovan), dont la zone cultivée s'est largement étendue entre 1967 et 2021 comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 22 : Orthophotographies aériennes de 1967 à gauche et 2021 à droite, des landes de Ty Lann à Plovan et détournement de la zone cultivée en pointillés rouge (© IGN)

La pratique du **camping sauvage** sous toutes ses formes (vans, camping-cars, bivouac, etc.) ainsi que la présence d'**animaux domestiques** (chiens et chevaux) en bordure du littoral, sont bien

souvent associées à des **dépôts de déchets et d'excréments**. Ils contribuent à la dégradation et à l'eutrophisation des milieux dunaires.

Figure 23 : Intervention mécanique pour aplanir la crête de dune sur l'accès du Concasseur pour le passage des véhicules des telliniers. © Grégory Thomas, CCHPB 2023

Les telliniers exerçant en baie d'Audierne disposent d'une dérogation préfectorale annuelle pour permettre leur circulation en véhicule terrestre à moteur sur le domaine public maritime. Les deux accès historiques à la plage se situent sur la commune de Tréguennec et nécessitent de franchir le cordon dunaire. L'accès du Concasseur, se situe au niveau de l'unique zone d'accrétion dunaire du territoire et est de ce fait régulièrement rendu

impraticable pour les véhicules. Une **intervention mécanique** est donc généralement réalisée au printemps pour abaisser la crête de dune.

(e) **Dérangement des espèces**

La **fréquentation** très importante du littoral induit également un dérangement de la faune. Cette notion reste toutefois difficile à appréhender puisqu'elle dépend de multiples facteurs (nature et intensité de la source de dérangement potentiel, sensibilité de l'espèce, période de l'année, etc.). Il faut de plus considérer le dérangement d'espèce, non pas sous l'angle d'une activité prise isolément, séparée de son contexte, mais englober, dans l'espace et dans le temps, l'éventail des pratiques ne laissant parfois que peu de répit à la faune.

Certains groupes d'utilisateurs posent des problématiques particulières de dérangement de la faune.

C'est le cas des **photographes animaliers** qui fréquentent assidument le site et notamment les zones de quiétude pour la faune de manière à observer au plus près les espèces. Certaines espèces sont particulièrement ciblées (Gravelot à collier interrompu, Guêpier d'Europe, Panure à moustache, etc.)

Les propriétaires de chiens respectent généralement bien l'obligation de tenir en laisse leurs animaux sur le périmètre terrestre du site notamment grâce à la présence régulière des gardes du littoral et à la sensibilisation qu'ils effectuent à ce sujet. Cependant, la plage reste perçue comme un espace de liberté pour les personnes et pour les animaux domestiques. Elle constitue donc un espace privilégié pour la **promenade des chiens** qui y sont bien souvent détachés voire en divagation.

Cela semble d'autant plus prégnant en période hivernale, lorsqu'il n'y a plus de cohabitation avec les touristes et que les enjeux écologiques sont inexistantes aux yeux du grand public. En effet, si la communication et la sensibilisation réalisée autour du Gravelot à collier interrompu engendre une responsabilisation de certains propriétaires de chiens en période de reproduction, les enjeux liés aux oiseaux migrateurs et hivernants restent mal connus du grand public.

Les pratiques du **motocross** et du **parapente** restent encore régulièrement observées sur le site. Elles occasionnent à la fois une dégradation des habitats naturels par la fréquentation de milieux fragiles et un dérangement des espèces qui occupent ces espaces normalement interdits d'accès pour le public. Les motocross sont associés à une perturbation sonore importante du site et les parapentes à un stress occasionné par le survol des zones de reproduction, de refuge, etc.

Le site accueille également chaque année des **manifestations d'ampleur** liées aux sports nautiques. Ces manifestations sont principalement concentrées sur le site de la Torche, mais elles peuvent s'étendre jusqu'à la plage de Tronoën. Ces événements provoquent un pic de fréquentation lié à la présence des compétiteurs et du public qu'ils attirent. Une perturbation sonore du site peut également y être constatée selon les modalités d'organisations (communications liées à la compétition, musique, etc.).

4 - Conservation, protection et valorisation de la future RNR

Le classement en RNR permettra d'asseoir l'importance de préservation du site des dunes et paluds bigoudènes en tant que site naturel exceptionnel. Il permettra ainsi de légitimer un peu plus les actions de préservation et de gestion des milieux naturels et de protection des espèces. Les actions de sensibilisation engagées dans le cadre de la RNR permettront à chacun de mieux connaître les enjeux de biodiversité. La réglementation mise en œuvre par les gestionnaires et les autres acteurs de la police de l'environnement confortera les actions de préservation déjà entreprises et limitera les sources de dégradation ou de dérangement sur le site.

La définition précise des objectifs à atteindre et les programmes d'actions à entreprendre pour y répondre sera travaillée au cours de **l'élaboration du plan de gestion** de la future RNR des dunes et paluds bigoudènes.

Le gestionnaire élaborera le plan de gestion dans un délai de deux ans suivant le dépôt de dossier de demande de classement au Conseil régional de Bretagne, dans les formes prévues par l'article R.332-43 du Code de l'environnement. Il est réalisé selon la méthodologie actualisée de l'Office Française de la Biodiversité (OFB) « guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels – outils de gestion et de planification » dénommé Cahier Technique 88 (CT88). Ce plan de gestion sera fondé sur le diagnostic écologique et socio-économique et définira les objectifs et les actions nécessaires à la bonne conservation du site.

Il sera élaboré en étroite collaboration avec le comité consultatif de gestion, le conseil scientifique et le comité des maires, lors de groupes de travail dédiés. Le plan de gestion de la RNR sera approuvé par délibération du Conseil régional de Bretagne, après avis du conseil scientifique de la Réserve, du comité des maires, du comité consultatif de gestion et du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN).

Les échanges et groupes de travaux menés au cours de la démarche en vue de la demande de classement en RNR du site des dunes et paluds bigoudènes ont permis de mettre en évidence **6 enjeux de conservation** conformément au tableau suivant.

Enjeux de conservation	Hiérarchisation
Les zones humides (rôles fonctionnels, biodiversité, complexes de milieux naturels, ressource en eau)	Prioritaire
L'estran et les milieux dunaires (dunes et cordon de galets, géomorphologie, fonctionnalité, biodiversité)	
Les landes sur serpentine (géologie, habitat, flore, invertébrés)	
Les paysages	
Le patrimoine vernaculaire (patrimoine culturel, habitat naturel)	Fort
Le patrimoine archéologique	Secondaire

De plus, **7 enjeux structurants** ont été identifiés, conformément au tableau suivant.

Enjeux structurants transversaux	Hiérarchisation
Acquisition de connaissances	Prioritaire
Sensibilisation du public	
Définition d'une stratégie foncière pour la cohérence du périmètre	
Adaptation au changement climatique	Fort
Adéquation entre les objectifs fixés et les moyens alloués	
Cohérence entre les politiques publiques et harmonisation des outils de protection de l'environnement	
Gestion à l'échelle des paysages	

La notion de paysage se retrouve à la fois dans les enjeux de conservation et dans les enjeux structurants. En effet, ils peuvent être rattachés d'une part à la conservation des paysages et donc des milieux naturels associés, et d'autre part à une échelle de travail, celle des unités fonctionnelles, qui devra être prise en compte de manière transversale dans la gestion du site. Pour éviter une redondance dans les informations présentées, les enjeux liés aux paysages seront présentés ici dans le paragraphe 4.1.4 et donc rattachés aux enjeux de conservation.

4.1 - Enjeux de conservation

4.1.1 - LES ZONES HUMIDES

Rôles fonctionnels, biodiversité, complexe de milieux naturels, ressource en eau

Les zones humides du site, reconnues d'importance internationale par le label Ramsar obtenu en 2021 représentent un enjeu prioritaire. Elles sont soumises à de nombreuses menaces : changements climatiques, évolution des milieux avec perte de potentiel écologique, présence d'espèces exotiques envahissantes, activités humaines et usages (pratiques agricoles, drainage, prélèvement d'eau, surcreusement de canaux, etc.).

Si ces milieux sont globalement bien connus en termes de biodiversité, leur **fonctionnement hydrologique** reste mal documenté et étudié, en particulier pour ce qui concerne l'interconnexion des trois grandes zones humides du site (étangs de Trunvel et de Kergalan et le Loc'h ar Stang) qui résultent d'anciens aménagements (canaux et exutoires sur l'estran au niveau de l'étang de Trunvel).

Une attention devra être apportée aux activités agricoles sur le site, mais également à proximité et plus largement à l'échelle du bassin versant. Les pratiques agricoles pourront être travaillées finement avec les exploitants concernés par le périmètre de la future RNR, conformément aux conventions qui encadrent leur activité. Un accompagnement des exploitants vers des **pratiques agro-environnementales** et des propriétaires vers des baux environnementaux serait souhaitable. Toutefois, ces démarches ne pourront être engagées que sur la base du volontariat pour les parcelles en dehors du périmètre classé. Ces démarches devront être entreprises en lien avec Ouesco qui travaille déjà en ce sens.

4.1.2 - L'ESTRAN ET LES MILIEUX DUNAIRES

Dunes et cordon de galets, géomorphologie, rôles fonctionnels, biodiversité

L'estran et les milieux dunaires constituent un enjeu prioritaire pour le projet du fait de la présence d'habitats naturels d'intérêt et d'espèces patrimoniales. Ils bénéficient déjà d'actions de protection et de gestion mais ils restent vulnérables à de nombreuses menaces : changement climatique et érosion du trait de côte, déficit sédimentaire, espèces exotiques envahissantes, nombreuses activités humaines et surfréquentation, atteintes à la qualité de l'eau (bactériologie et phytosanitaire), mise en culture, dégradation mécanique des dunes, etc.

Dans le cadre du projet de RNR, il semble donc essentiel de travailler à renforcer les protections existantes sur ces milieux en instituant par exemple des **zones de quiétude** pour le patrimoine naturel.

Très attractifs, ces milieux sont connus du grand public et attirent chaque année plus de visiteurs. Le lien avec les offices de tourisme devra être renforcé et une attention devra être apportée à ne plus communiquer ou du moins à communiquer différemment sur ces milieux dans un objectif **d'accueillir mieux le public, plutôt que d'accueillir plus.**

Par ailleurs, il sera nécessaire de **développer les connaissances sur la fréquentation** de ces espaces par des données quantitatives et qualitatives. Elles devront permettre d'objectiver ces éléments, d'estimer la capacité de charge du site, de mesurer les incidences réelles de activités et usages sur le patrimoine et ainsi d'orienter les actions de gestion et d'aménagements vers un bon équilibre entre les usages et la conservation des patrimoines naturels et historiques.

En termes de connaissances naturalistes, ces espaces sont globalement bien connus pour leur partie terrestre. Toutefois certains groupes taxonomiques mériteraient d'être investigués pour **compléter les données existantes**. C'est le cas des invertébrés et notamment des papillons de nuit, mais également des chiroptères. De plus, les habitats marins du site et la biodiversité qu'ils abritent restent mal connus et devront donc faire l'objet d'acquisition de connaissances.

4.1.3 - LES LANDES SUR SERPENTINE

Géologie, habitat, flore, invertébrés

Moins connus du public que les grands espaces dunaires et les zones humides du territoire, les landes sur serpentine présentent un intérêt patrimonial très important pour le territoire, en tant qu'habitat unique en Bretagne. Il serait donc intéressant de le **faire découvrir au public** tout en

conservant des zones non ouvertes au public pour préserver ces milieux fragiles et leur quiétude. La carrière de Pontalan se prête tout particulièrement à l'accueil du public et à la découverte des spécificités de cet habitat : elle offre la possibilité d'observer la serpentine ainsi que la lande dans ses premiers stades de développement. A l'inverse, le site de Ty Lann gagnerait à rester confidentiel.

Les landes sur serpentine sont connues des naturalistes bénévoles du territoire et les données qui y sont collectées sont pour la plupart opportunistes. La mise en place de **protocoles de suivi** de cet habitat et des espèces qu'il abrite seraient donc souhaitable, notamment en ce qui concerne la végétation et les invertébrés.

La mise en place d'une gestion fine de ces milieux serait nécessaire, en lien avec le CBNB, pour assurer leur maintien en **bon état de conservation**, voire la restauration de certains secteurs. Un travail a déjà été initié en ce sens dans le cadre de Natura 2000 pour les landes de Trunvel et Kergalan. Il n'a pas encore pu aboutir par manque de moyens humains suite au départ du chargé de mission Natura 2000 en mars 2024. Ce projet devra être repris et poursuivi.

Deux menaces principales s'exercent sur cet habitat. D'une part, le **vieillessement** de la lande et sa fermeture progressive qui conduit à une perte de potentiel écologique. Cette évolution naturelle des milieux landicoles est moins fort pour les landes littorales soumises aux vents et aux embruns qui limitent le développement de la végétation. Toutefois, une intervention peut être nécessaire en bordure d'habitat pour limiter la progression des ligneux. D'autre part, le **manque de protection forte** (réglementaire et/ou foncière) sur les secteurs de Ty Lann (Plovan) et de Pontalan (Peumerit). En effet, les secteurs de Ty Lann et de Pontalan ne pourront pas être intégrés à la demande de classement initial en raison du refus des propriétaires privés de contribuer à ce projet. Il serait donc pertinent de chercher à assurer la protection de ces secteurs par d'autres outils que la RNR ou en garantissant qu'ils pourront être intégrés au périmètre lors d'un renouvellement de classement.

4.1.4 - LES PAYSAGES

La baie d'Audierne est reconnue pour ses vastes **paysages ouverts et sauvages**. Cependant, différentes pressions s'y exercent :

- l'abandon des pratiques de gestion traditionnelles conduisant à la fermeture des habitats,
- l'augmentation des niveaux d'eau dans les étangs de Trunvel et Kergalan qui entraîne le report des roselières en bordure d'étang au détriment des prairies humides,
- le développement d'espèces exotiques envahissantes qui perturbent le fonctionnement des milieux qu'elles colonisent,
- la fréquentation et les activités humaines qui, selon leur intensité, leur fréquence et leurs modalités, peuvent conduire à la dégradation des milieux,
- le manque d'intégration paysagère des aménagements qui sont alors visibles sur de grandes distances,
- etc.

Le plan de gestion qui sera élaboré pour le site devra donc assurer la mise en place d'actions de conservation à l'échelle des grandes entités paysagères du site. Une attention devra être portée au maintien des mosaïques d'habitats et à l'expression de différents stades des successions écologiques. Il sera nécessaire également de réfléchir aux aménagements liés à l'accueil et à la

canalisation du public ainsi qu'à la gestion des milieux naturels en termes d'intégration paysagère et d'harmonisation.

Par ailleurs, il serait pertinent de mettre en place des suivis photographiques participatifs avec le public (observatoire photographique des paysages) pour permettre de constituer une base de données sur l'**évolution des paysages**. Cette notion reste bien souvent difficile à appréhender mais est particulièrement importante à traiter notamment dans le cadre du recul du trait de côte et du changement climatique. Cela pourrait constituer un support pour accompagner les habitants du territoire vers une acceptation de ces changements et de leurs effets sur le patrimoine.

De plus, le site dispose de plusieurs points de vue importants qui peuvent être valorisés : le Concasseur, l'observatoire paysager de la maison de la baie d'Audierne, la route de Penhors à Tréogat, l'axe depuis la chapelle de Tronoën vers la plage, etc (cf figure 24).

Figure 24 : Principaux points de vue du site - en haut, à gauche, depuis la rampe du concasseur / à droite, depuis l'observatoire paysager de la MBA / en bas, à gauche, la route de Tronoën / à droite, la route de Penhors à Tréogat

4.1.5 - LE PATRIMOINE VERNACULAIRE

Patrimoine culturel, habitat pour la petite faune

Le patrimoine vernaculaire (murets, talus, lavoirs, fours à Goémon, etc.) est disséminé sur le territoire et témoigne de son histoire locale. Il représente à la fois un patrimoine culturel et un habitat naturel pour la biodiversité qui y trouve un support de développement. Laissés à l'abandon, ce patrimoine est progressivement recouvert par la végétation, fragilisé et perd en attractivité pour

la faune dans certains cas. Certains éléments situés à proximité directe du littoral, comme les fours à Goémon, sont également menacés par le recul du trait de côte.

Le **recensement** de ces éléments de patrimoine local et le cas échéant, leur **entretien** serait nécessaire pour garantir leur conservation et leurs rôles écologiques et paysagers. Ils pourraient également **être valorisés** au travers d'une redécouverte du savoir-faire local qui y est associé : entretien des talus et des haies associées, construction de murets de pierres sèches, etc.

4.1.6 - LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Le Pays bigouden est particulièrement riche en ce qui concerne le patrimoine archéologique, à la fois en termes d'époques représentées et de nombre d'éléments recensés. Il peut être soumis au recul du trait de côte et au piétinement lié à la fréquentation du public. Il reste cependant assez peu valorisé sur le territoire et mériterait de faire objet d'un programme de découverte pour le public (sentiers et animations thématiques, outils d'interprétation, etc.).

Le musée de la préhistoire de Penmarc'h représentait un outil intéressant pour la valorisation de ce patrimoine avec l'exposition de collections, notamment locales, retraçant l'histoire de la basse Bretagne du paléolithique au moyen-âge. Il est fermé au public depuis 2020 en raison de problématiques de sécurité liés au bâtiment qui lui était dédié. Le **devenir des collections** dont il dispose serait à réfléchir pour assurer leur bonne conservation et leur valorisation auprès du public, si possible sur le territoire.

Une **veille** portant sur le matériel archéologique lié au site serait également à réaliser afin de pouvoir collecter et conserver ce patrimoine.

4.2 - Enjeux structurants transversaux

4.2.1 - ACQUISITION DE CONNAISSANCES

La **station de baguage de Trunvel** est ouverte par Bretagne vivante depuis 1988. Chaque année, un suivi de 4 mois y est effectué (début juillet à fin octobre), ce qui la place comme l'une des plus importantes stations de baguage de France.

Elle s'inscrit dans le cadre de 3 programmes de recherche :

- Le programme ACROLA pour le suivi de la migration post-nuptiale du Phragmite aquatique ;
- Le programme PHENOlogie pour l'étude des variations de phénologie migratoire des passereaux (dates de migration) ;
- Le programme SEJOUR pour l'étude des stratégies migratoires (temps de séjour, taux d'engraissement et nombre d'oiseaux en transit)

La station de baguage constitue un outil essentiel de la connaissance du patrimoine naturel sur le site.

De plus, le site étant connu depuis longtemps pour son patrimoine naturel d'exception, il est fréquenté par de nombreux naturalistes. La section locale de Bretagne vivante est, de plus, très active et représentée par de **nombreux bénévoles** qui contribuent à l'acquisition de données. Si

certain suivis protocolés sont appliqués par les bénévoles, la majeure partie des données collectées sont opportunistes.

Un **partenariat scientifique** important sera donc à développer entre Bretagne vivante et la future RNR pour poursuivre conjointement l'acquisition de connaissances et permettre la standardisation et donc l'exploitation des données disponibles.

D'autres **structures naturalistes** sont également présentes sur le territoire, le conservatoire botanique national de Brest, le GRETIA, le GMB, etc., et des **observatoires thématiques** sont en place. L'ensemble de ces partenaires impliqués dans la connaissance et la conservation du site devront être associés à la gestion et au fonctionnement de la future RNR.

4.2.2 - SENSIBILISATION DU PUBLIC

Les communautés de communes assurent déjà actuellement une mission de sensibilisation des publics à l'environnement par le biais des **animations natures** qu'elles proposent. Cette offre d'animations est principalement tournée vers les scolaires et, en période de vacances scolaires, le « grand public ». Un **projet pédagogique pour la RNR** devra être mis en place. Il pourra intégrer les animations déjà réalisées aujourd'hui sur le site mais également prévoir de nouvelles thématiques, approches et supports de sensibilisation pour compléter l'offre existante.

La **maison de la baie d'Audierne** est idéalement placée au cœur du site. Propriété du Conservatoire du littoral et animée par l'association des amis de la baie d'Audierne, elle constitue un lieu d'accueil du public et de sensibilisation aux patrimoines naturels et historiques du territoire.

Un travail de **réflexion sur les orientations à donner à cet espace** est aujourd'hui nécessaire afin de réaliser les réfections et les aménagements pour assurer sa pérennité. Naturellement identifiée comme **maison de site potentielle** pour le projet de RNR des dunes et paluds bigoudènes, ses préoccupations et objectifs devront être pris en compte dans le projet d'aménagement de la maison de la baie d'Audierne.

De plus, un partenariat pédagogique devra être proposé entre la RNR et l'association des amis de la baie d'Audierne pour conjuguer les efforts de sensibilisation du public sur le site.

Le territoire est concerné par l'application de divers outils de protection, labels et politiques territoriales en faveur de l'environnement dont la lisibilité est généralement complexe pour le public. Une **harmonisation des messages de sensibilisation** et des outils de communication serait nécessaire assurer leur efficacité en termes pédagogiques et réglementaires. En particulier, il sera nécessaire de développer des outils de communication pour **faire connaître et expliquer les réglementations** qui s'y appliquent.

Au regard de l'étendue du site, son **balisage** devra être étudié par anticipation et éventuellement programmé en plusieurs étapes pour faciliter la bonne appropriation locale de l'outil.

Le territoire accueille un grand nombre de **professionnels** notamment liés au tourisme et aux sports de nature (clubs et écoles nautiques, hébergeurs, restaurateurs, etc.). En contact direct avec les usagers et visiteurs, ils constituent des relais importants pour la transmission des connaissances et la sensibilisation du public aux enjeux du site. Les liens avec ces professionnels devront donc être développés pour leur apporter les outils et connaissances nécessaires.

4.2.3 - STRATEGIE FONCIERE

Le périmètre du projet de RNR est ambitieux. Travaillé en plusieurs étapes « entonnoir », il peut être décliné en plusieurs zonages : le périmètre scientifique idéal, le périmètre d'animation foncière et le périmètre qui sera effectivement proposé au classement.

Une **stratégie foncière** a dû être travaillée et appliquée pour permettre de consolider progressivement le périmètre classé en RNR et ainsi aboutir au périmètre le plus cohérent possible au regard des enjeux écologiques du site. Cette démarche d'animation foncière devra être poursuivie tout au long de la mise en œuvre de la RNR pour compléter le périmètre proposé au classement dans ce dossier.

La maîtrise foncière publique est un atout considérable pour la conservation des espaces naturels. Le périmètre terrestre proposé au classement est composé à un peu plus de 90 % de terrains publics. En particulier, le Conservatoire du littoral a une action historique sur ce site, les premières acquisitions y ayant débutées en 1982. Une évolution des périmètres d'intervention du Cdl sur le site pourrait être proposée de manière à y intégrer l'ensemble des parcelles qui ont été identifiées dans le cadre de ce projet. Le Département du Finistère intervient sur le secteur de Gourinet (limitrophe entre Plozévet et Pouldreuzic). Il y possède dès à présent quelques parcelles et des acquisitions ont été initiées grâce aux prises de contact avec les propriétaires privés dans le cadre de la démarche d'animation foncière pour le projet de RNR.

4.2.4 - ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La prise en compte du **changement climatique** devra être assurée pour permettre l'adaptation du site et de sa gestion aux effets de ces changements, plutôt que de les subir. En cela, l'application de la **méthodologie Natur'adapt** est un atout majeur pour le projet.

La Région et la DREAL portent actuellement un projet de déploiement de cette méthodologie en Bretagne par l'accompagnement technique et financier de 6 réserves naturelles et/ou projets de réserve naturelle, dont le projet de RNR bigoudène. En effet, la vulnérabilité du site au changement climatique, notamment du fait de sa situation littorale et de l'importance de ses zones humides justifie l'implication du site dans ce projet. Il est mis en œuvre depuis mars 2025 dans le cadre d'un stage de master 2.

Cela permettra d'intégrer, dès l'élaboration de son premier plan de gestion, le diagnostic de vulnérabilité et le plan d'adaptation au changement climatique, en accord avec la stratégie nationale pour les aires protégées et les besoins identifiés pour le site.

4.2.5 - ADEQUATION ENTRE LES OBJECTIFS FIXES ET LES MOYENS ALLOUES

Une attention particulière a été portée à **l'adéquation entre les moyens alloués au projet et son ambition**. En effet son périmètre, et notamment la prise en compte de l'estran, nécessitera de développer les moyens de surveillance et de police sur le site et donc de renforcer les équipes actuelles. Il a ainsi semblé nécessaire de prévoir un doublement des effectifs d'agents chargés de la surveillance du site (actuellement 2 ETP gardes du littoral), notamment au regard de l'effort spécifique de surveillance/sensibilisation qui sera nécessaire sur les plages.

Un travail de **coordination des différents corps de police** amenés à intervenir sur le territoire devra également être effectué pour renforcer les liens et harmoniser la réponse apportée par chaque agent en termes de sensibilisation des usagers et de réponse aux infractions constatées.

Un renfort des équipes techniques pour l'entretien des espaces naturels et des sentiers de randonnée et des animateurs nature, pourra également être envisagé lors de l'élaboration du plan de gestion.

4.2.6 - COHERENCE ENTRE LES POLITIQUES PUBLIQUES ET HARMONISATION DES OUTILS DE PROTECTION

L'existence de divers outils de protection de l'environnement sur le territoire nécessite de rechercher une bonne **articulation** et une **mutualisation des moyens** pour assurer leur efficacité conjointe. La mise en place d'un **document unique de gestion** pour la future RNR, les sites Natura 2000 baie d'Audierne et les propriétés du Conservatoire du littoral sur les sites baie d'Audierne et marais de la Joie et de Lescors a ainsi été évoquée dans le cadre de la préfiguration de la RNR. De même, la mutualisation des instances de suivi Natura 2000 et RNR serait à prévoir pour éviter la sursollicitation des partenaires qui sont pour la plupart concernés par ces deux outils et disposer d'une cohérence d'action.

5 - Conclusion

Le site des dunes et paluds bigoudènes est reconnu de longue date par les communautés scientifiques pour ses patrimoines diversifiés et remarquables. La demande de classement en Réserve naturelle régionale pour ce site vient répondre à un besoin de renforcer la protection et les moyens de conservation de ces patrimoines naturels et historiques qui sont les témoins de l'évolution du territoire, des dynamiques du vivant et de l'occupation humaine.

Les données naturalistes sur le site sont nombreuses et particulièrement développées pour certains groupes taxonomiques. C'est le cas notamment pour l'avifaune pour laquelle la station de baguage de Trunvel, en place depuis 1988, constitue un outil fondamental d'étude des populations d'oiseaux et de leurs évolutions. Les données restent toutefois lacunaires et/ou anciennes pour d'autres groupes taxonomiques. Elles devront donc faire l'objet d'un axe de travail important dans le plan de gestion de la future RNR, en particulier pour l'actualisation de la cartographie d'habitats et l'acquisition de connaissances sur le patrimoine naturel maritime du site. Véritables territoires d'expérimentation et laboratoires pour la recherche scientifique, les réserves naturelles sont au cœur de ces dynamiques de développement et d'actualisation continue des connaissances.

Cela est d'autant plus important dans le contexte des changements climatiques actuels qui placent les espaces naturels protégés comme des lieux d'étude des changements et de leurs effets sur le patrimoine naturel. Ainsi, le déploiement en cours de la méthodologie Natur'adapt sur le site devra permettre de mieux appréhender les évolutions des milieux et des espèces, et ainsi de mettre en œuvre une gestion adaptative du site pour intégrer ces changements actuels et à venir.

En rejoignant le réseau des réserves naturelles bretonnes et plus largement des réserves naturelles de France, le site des dunes et paluds bigoudènes pourra d'une part bénéficier de l'expertise des autres réserves naturelles, mais également contribuer à de nouveaux partenariats et projets collectifs. Cette implication à des échelles plus larges que celle du site est essentielle pour renforcer l'efficacité des actions de protection des espèces migratrices, mais également assurer la fonctionnalité des voies de dispersion et de déplacement dans un réseau de continuités écologiques.

6 - Bibliographie / webographie

Arrêté n°29-2021-05-05-00015 – Arrêté du 5 mai 2021 portant création de la liste des sites d'intérêt géologique du département du Finistère (9p).

Bargain B. & Henry J., 2005. Les oiseaux de la baie d'Audierne. Penn ar Bed n°193/194 : 84 p.

Blais S., Ballèvre M., Graviou P. et Rolet J., 2011. Curiosités géologiques du Pays bigouden. BRGM Apogée, Orléans-Rennes, 120 p.

Buisson B., 2010. *Document d'objectifs du site Natura 2000 de la baie d'Audierne – Etat des lieux et objectifs de gestion durable*. SIVU de la baie d'Audierne, Tréguennec, 234pp.

Chatain R. 2018. Baie d'Audierne : du Pays bigouden au Cap Sizun. Edition AGDL. Collection Territoire. 104 p.

Citoleux J., Lambert E., Guerlesquin M., 2007. Les Characées de la baie d'Audierne : Evolution du site au cours des 15 dernières années. *E.R.I.C.A.* 20 : 55-64.

Cogné J., 1960. Schistes cristallins et granites en Bretagne méridionale. Le domaine de l'anticlinal de Cornouaille. *Mém. Serv. Carte Géol. Fr.*, 382 p.

Corillon R., 1994. Les Characées de la baie d'Audierne. Penn ar Bed n°152: 1-19

Delzons O., Cima V., Fournier C., Gourdain P., Hérard K., Lacoëuilhe A., Laignel J., Roquinarç'h O., Thierry C., 2021. Indice de qualité écologique (IQE) Indice de potentialité écologique (IPE) - Guide méthodologique. Office français de la biodiversité. Collection Guides et protocoles. 104 pages

De Wever P., Le Nechet Y., Cornée A., 2006. Vade-mecum pour l'inventaire du patrimoine géologique national. *Mémoire Hors-Série. Société géologique de France*, vol.12, 162 p.

De Wever P., Egoroff G., Cornée A., Lalanne A. (eds.), 2014. Géopatrimoine en France. *Mémoire HorsSérie - Société géologique de France*, no. 14, 180 p.

Faye I. B. Nd. 2004 – Etude de la position du trait de côte de la Baie d'Audierne entre Penhors et la pointe de La Torche : comparaison des méthodes de la photo-interprétation et des levés topographiques. *Mémoire de D.E.A, Université de Bretagne Occidentale*, 128 p.

Faye I. B. Nd., Henaff A., Hallégouët B., 2007. Evolution récente de la ligne de rivage en baie d'Audierne : de Penhors à la pointe de la Torche. Penn ar Bed n° 199 : 50-61

- Gloaguen E., Melleton J., Lefebvre G., Tourlière B., Yart S. avec la collaboration de Gourcerol B., 2018. Ressources métropolitaines en lithium et analyse du potentiel par méthodes de prédictivité. Rapport final. Rapport BRGM/RP-68321-FR, 126 p.
- Guilcher A., Hallegouet B., 1981. Le haut cordon de galets pléistocène de Ruvein-en-Plovan (Finistère) et ses enseignements généraux. In : Bulletin de l'Association française pour l'étude du quaternaire, vol. 18, n°2, pp. 75-82.
- Guyot G., Callard B., Guilbault E., 2018. Changements de la phénologie de la migration à Trunvel, Ar Vran 28 (2), pp. 36-44.
- Guyot G., Ernst S., 2019. Bilan de la station de baguage de Trunvel. Bretagne Vivante, 30P.
- Guyot G., Gorget N., 2022. Bilan de la station de baguage de Trunvel. Bretagne Vivante, 33P.
- Hardegen M., Quéré E., 2019 - *Hiérarchisation des enjeux : flore vasculaire. Méthode d'évaluation des enjeux de conservation à l'échelle d'un territoire & résultats de la hiérarchisation pour la flore vasculaire indigène de Bretagne*. DREAL Bretagne, Région Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest. 8 p., 2 annexes.
- Julliard, R., Bargain, B., Dubos, A., et Jiguet, F., 2006. Identifying autumn migration routes for the globally threatened Aquatic Warbler *Acrocephalus paludicola* : Autumn migration route of Aquatic Warbler. Ibis 148, 735–743.
- Laurent E., 2023 – *Synthèse des enjeux de conservation liés à la flore et aux habitats (semi-) naturels. Contribution à la démarche de préfiguration de la Réserve naturelle régionale des dunes et paluds bigoudènes (29)*. Région Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest. 8 p., 1 annexe.
- Laurent E., 2024 - *Accompagnement d'une mission de prospection et de prélèvement de characées en baie d'Audierne dans le cadre d'un programme de recherche. Compte-rendu de la visite de terrain du 21 juin 2024*. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 7 p., 1 annexe.
- Le Bail J., Lambert E., Magnanon S., 2012 - Pour un inventaire actualisé des Characées de l'ouest de la France. *E.R.I.C.A.*, 25 : 75-90.
- Olson D.M., Dinerstein E., Wikramanayake E.D., Burgess N.D., Powell G.V.N., Underwood E.C., D'Amico J.A., Itoua I., Strand H.E., Morrison J.C., Loucks C.J., Allnutt T.F., Ricketts T.H., Kura Y., Lamoreux J.F., Wettengel W.W., Hedao P., Kassem K.R., 2001. Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on Earth. *Bioscience* vol.51, no.11, 933-938 p.
- Provost P., Bargain B., Cheveau P. 2011 – Écologie du Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* sur deux sites de halte majeures pendant le passage post-nuptial dans l'ouest de la France. *Alauda* 79 : 53-63.
- Siorat F. (Coord.), 2010. Les espèces marines invasives en Bretagne. GIIP Bretagne environnement, 41 p.
- Spalding M.D., Fox H.E., Allen G.R., Davidson N., Ferdaña Z.A., Finlayson M.A.X., Halpern B.S., Jorge M.A., Lombana A., Lourie S.A., Martin K.D., McManus E., Molnar J., Recchia C.A., Robertson J., 2007. Marine ecoregions of the world : a bioregionalization of coastal and shelf areas. *BioScience*, vol.57, no.7, 573-583 p.

Spygen, 2023. Rapport d'analyse - Analyses VigiDNA M pour l'inventaire des Poissons et des Mammifères aquatiques en grand milieu aquatique stagnant. 6 p.

Yoni C. et Latteux B., 2004. *Expertise géomorphologique sur la baie d'Audierne (Finistère)* – étude pour le compte du CELRL.

<https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/BRE0114>

<https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/BRE0183>

7 - Annexes

Annexe 1 - Liste des taxons végétaux à forte valeur patrimoniale et évaluation des enjeux de conservation (d'après Laurent E., 2023).

Annexe 2 – Liste du phytoplancton recensés sur le site

Annexe 3 - Méthodologie d'analyse de la patrimonialité des espèces faunistiques

Annexe 4 – Liste des oiseaux nicheurs recensés sur le site

Annexe 5 - Liste des oiseaux migrateurs recensés sur le site

Annexe 6 - Liste des oiseaux hivernants recensés sur le site

Annexe 7 - Liste des odonates recensés sur le site

Annexe 8 - Liste des lépidoptères recensés sur le site

Annexe 9 – Liste des orthoptères recensés sur le site

Annexe 10 – Liste des arachnides recensés sur le site

Annexe 11 – Liste des hétérocères aquatiques recensés sur le site

Annexe 12 – Liste des coléoptères recensés sur le site

Annexe 13 – Liste des autres invertébrés continentaux recensés sur le site

Annexe 14 – Liste des invertébrés marins recensés sur le site

Annexe 15 – Liste des amphibiens et reptiles recensés sur le site

Annexe 16 – Liste des mammifères recensés sur le site

Annexe 17 – Liste des poissons recensés sur le site

Annexe 1 - Liste des taxons végétaux à forte valeur patrimoniale et évaluation des enjeux de conservation (d'après Laurent E., 2023).

Enjeu	Nom	DHFF	Prot	LR Fr	LR Bzh	LRM A	Obs
NSR Bzh	<i>Anchusa azurea</i>	-		LC	RE	anx2	1996
Majeur	<i>Festuca ovina subsp. bigoudenensis</i>	-	BZH	NE	EN	anx1	2022
	<i>Myosotis sicula</i>	-	BZH	NT	EN	anx1	1995
	<i>Polygonum oxyspermum subsp. raii</i>	-	Nat	NT	VU	anx1	2005
Très fort	<i>Apera interrupta</i>	-	-	LC	VU	-	2011
	<i>Avena sterilis subsp. ludoviciana</i>	-	-	LC	NE	-	2019
	<i>Carex acutiformis</i>	-	-	LC	EN	anx2	1996
	<i>Eleocharis quinqueflora</i>	-	-	LC	EN	anx1	2016
	<i>Gymnadenia conopsea</i>	-	-	LC	VU	anx1	2019
	<i>Hippuris vulgaris</i>	-	-	NT	VU	anx1	2019
	<i>Juncus subnodulosus</i>	-	-	LC	VU	-	2019
	<i>Lathyrus palustris subsp. palustris</i>	-	-	EN	CR	anx1	2015
	<i>Legousia hybrida</i>	-	-	LC	CR	anx1	2010
	<i>Liparis loeselii var. loeselii</i>	anx2&4	Nat	NE	NT	-	2020
	<i>Lithospermum arvense</i>	-	-	LC	EN	-	2012
	<i>Lithospermum officinale</i>	-	-	LC	VU	anx1	1996
	<i>Onopordum acanthium subsp. acanthium</i>	-	-	LC	VU	-	2022
	<i>Orchis palustris</i>	-	BZH	VU	VU	anx1	2015
	<i>Otanthus maritimus</i>	-	BZH	LC	VU	anx1	2019
	<i>Potamogeton coloratus</i>	-	-	LC	VU	anx1	2017
	<i>Ranunculus circinatus</i>	-	-	LC	NE	anx1	2017
	<i>Ranunculus lingua</i>	-	Nat	VU	LC	anx1	2016
	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>	-	Nat	LC	VU	anx1	2010
	<i>Sagina nodosa</i>	-	BZH	NT	VU	anx1	2021
	<i>Scirpus pungens</i>	-	-	LC	VU	anx1	2022
<i>Spiranthes aestivalis</i>	anx4	Nat	VU	NT	anx1	2022	
<i>Teucrium scordium subsp. scordioides</i>	-	-	LC	VU	anx1	2015	
<i>Thalictrum flavum subsp. flavum</i>	-	-	LC	VU	anx1	2021	
<i>Triglochin palustris</i>	-	-	LC	VU	anx2	2021	
<i>Urtica membranacea</i>	-	BZH	LC	VU	anx1	2015	
Fort	<i>Astragalus baionensis</i>	-	Nat	LC	NT	anx1	2020
	<i>Berula erecta</i>	-	-	LC	NT	anx2	2021
	<i>Butomus umbellatus</i>	-	-	LC	NT	anx2	2021
	<i>submersum</i>	-	-	LC	NT	anx1	2017
	<i>Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata</i>	-	-	NT	NT	anx2	2020
	<i>Eleocharis uniglumis</i>	-	-	LC	NT	-	2019
	<i>Epipactis palustris</i>	-	-	NT	LC	-	2022
	<i>Filipendula vulgaris</i>	-	-	LC	NT	anx1	2021
	<i>Gastroidium ventricosum</i>	-	-	LC	NT	-	2007
	<i>Lepidium latifolium</i>	-	-	LC	NT	anx2	2005

	<i>Medicago marina</i>	-	-	LC	NT	-	2018
	<i>Ononis reclinata</i>	-	-	LC	NT	anx1	2019
	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	-	BZH	LC	NT	anx1	1999
	<i>Papaver argemone</i>	-	-	LC	NT	-	2013
	<i>Papaver hybridum</i>	-	-	LC	NT	-	2011
	<i>Polygonum maritimum</i>	-	BZH	LC	NT	anx1	2021
	<i>Potamogeton pusillus</i>	-	-	LC	NT		2017
	<i>Ranunculus baudotii</i>	-	-	LC	NT	anx2	2008
	<i>Trifolium strictum</i>	-	-	LC	NT	anx2	2008
	<i>Triglochin bulbosum subsp. barrelieri</i>	-	-	LC	NT	anx1	2005
	<i>Vulpia ciliata subsp. ambigua</i>	-	-	LC	NT	-	1996
	<i>Vulpia ciliata subsp. ciliata</i>	-	-	LC	NT	-	1996
Réglementaire	<i>Crambe maritima</i>	-	Nat	LC	LC	anx2	2019
	<i>Eryngium maritimum</i>	-	BZH	LC	LC	anx2	2021
	<i>Linaria arenaria</i>	-	BZH	LC	LC	anx1	2020
	<i>Littorella uniflora</i>	-	Nat	LC	LC	-	2012
	<i>Lotus parviflorus</i>	-	BZH	LC	LC	anx1	1992
	<i>Luronium natans</i>	anx2&4	Nat	LC	LC		1996
	<i>Orchis coriophora subsp. fragrans</i>	-	Nat	LC	DD	anx1	1992
	<i>Parentucellia latifolia</i>	-	BZH	LC	LC	-	2013
	<i>Serapias parviflora</i>	-	Nat	LC	LC	anx1	2014
Autres taxons intéressants	<i>Asparagus officinalis subsp. prostratus</i>	-	-	LC	LC	anx2	2021
	<i>Atriplex littoralis</i>	-	-	LC	LC	anx2	2020
	<i>Bellardia trixago</i>	-	-	LC	LC	anx1	2021
	<i>Bromus commutatus subsp. commutatus</i>	-	-	LC	DD	anx2	2009
	<i>Bupleurum tenuissimum subsp. tenuissimum</i>	-	-	LC	LC	anx2	2005
	<i>Carex muricata subsp. lamprocarpa</i>	-	-	LC	LC	anx1	2007
	<i>Carex rostrata</i>	-	-	LC	LC	anx2	2008
	<i>Cynoglossum officinale</i>	-	-	LC	LC	anx2	2009
	<i>Epilobium palustre</i>	-	-	LC	LC	anx2	2015
	<i>Najas marina</i>	-	-	LC	LC	anx2	2021
	<i>Ophrys apifera</i>	-	-	LC	LC	anx2	2014
	<i>Salix repens subsp. dunensis</i>	-	-	NE	LC	anx1	2022
	<i>Schoenus nigricans</i>	-	-	LC	LC	anx2	2021
	<i>Solanum dulcamara var. marinum</i>	-	-	NE	LC	anx1	2020
<i>Thelypteris palustris</i>	-	-	LC	LC	anx1	2007	

Enjeu : résultat de l'évaluation des enjeux floristiques selon la méthode proposée par Hardegen & Quéré, 2019 ; « NSR Bzh » : non signalé récemment en Bretagne

Nom : selon le Référentiel nomenclatural de la flore de l'ouest de la France : <http://www.cbnbrest.fr/RNFO/> (juillet 2023) ;

DHFF 1992 : inscription du taxon à l'annexe 2 et/ou 4 de la directive européenne Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE ;

Protection : « Nat » pour les taxons protégés à l'échelle nationale, « BZH » pour les taxons protégés à l'échelle régionale ;

LR Fr / LR Bzh : catégorie de menace sur la Liste rouge des espèces menacées en France (UICN France & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018) / sur la Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne (Quéré, Magnanon, Brindejonc, 2015)

LRMA : inscription du taxon sur la Liste rouge du Massif armoricain (Magnanon, 1993) organisée en 2 principales annexes : « anx1 » pour les taxons considérés comme rares dans tout le Massif armoricain ou subissant une menace générale très forte et « anx2 » pour les taxons rares sur une partie du territoire et plus communs ailleurs mais paraissant néanmoins menacés et/ou plantes en limite d'aire, rares dans le Massif armoricain mais assez communes à l'extérieur de nos limites ;

Obs. : année de la dernière donnée correspondant au taxon sur le site dans les bases de données du CBN de Brest.

Espèces introduites			
Statut	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Obs.
Invasive avérée	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven	Jussie faux péplis	2021
	<i>Ludwigia uruguayensis</i> (Cambess.) H.Hara	Jussie à grandes fleurs	2020
	<i>Allium triquetrum</i> L.	Ail à tige triquètre	2023
	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolle fausse fougère	2020
	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Baccharis à feuilles d'Halimium	2010
	<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident feuillé	2010
	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Herbe de la Pampa	2014
	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett.	Chalef presque à grandes feuilles	2019
	<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurier-sauce	2007
	<i>Lemna minuta</i> Kunth	Lentille d'eau menue	2010
Invasive potentielle	<i>Abies alba</i> Mill.	Sapin pectiné	2007
	<i>Anthemis maritima</i> L.	Anthémide maritime	1996
	<i>Conyza floribunda</i> Kunth	Érigéron très fleuri	2022
	<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	Montbrétia à fleurs de crocosmia	2019
	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Élodée du Canada	2007
	<i>Lonicera japonica</i> Thunb. ex Murray	Chèvrefeuille du Japon	2010
	<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) C.Presl	Pétasite des Pyrénées	2019
	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Pin maritime	2021
	<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	2022
	<i>Yucca gloriosa</i> L.	Yucca superbe	2019
A surveiller	<i>Bromus willdenowii</i> Kunth	Brome cathartique	2022
	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Pain-blanc	2012
	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Érigéron de Karwinsky	2019
	<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbás	Onagre à sépales rouges	2017
	<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	Polypogon vert	2022
	<i>Atriplex halimus</i> L.	Arroche halime	2019
	<i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd.	Bident à feuilles connées	2020
	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Erigeron du Canada	2017
	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker	Érigéron de Sumatra	2005
	<i>Euonymus japonicus</i> L.f.	Fusain du Japon	2023
	<i>Prunus cerasus</i> L.	Cerisier acide	1994
	<i>Allium ampeloprasum</i> subsp. <i>ampeloprasum</i> L.	Ail faux poireau	1995
	<i>Aster novi-belgii</i> L.	Aster de Virginie	1992
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Scabieuse maritime	2005	
<i>Vinca major</i> L.	Grande pervenche	2019	

Statut : inscription du taxon sur la liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes en Bretagne (Burguin, 2024) : cf. https://www.cbnbrest.fr/pmb_pdf/CBNB_Burguin_2024_71957.pdf

Nom du taxon : nom selon le Référentiel nomenclatural de la flore de l'ouest de la France : <http://www.cbnbrest.fr/RNFO/> (septembre 2024) ;

Obs. : année de la dernière donnée correspondant au taxon sur le site dans les bases de données du CBN de Brest.

Annexe 2 – Liste du phytoplancton recensés sur le site

Phylum	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Obs.
Algues brunes (Ochrophyta)	<i>Attheya armata</i> (T.West) R.M.Crawford, 1994		1989
	<i>Pseudo-nitzschia americana</i> (Hasle) G. A. Fryxell, 1993		1989
	<i>Pseudo-nitzschia australis</i> Freng., 1939		1989
	<i>Pseudo-nitzschia delicatissima</i> (Cleve) Heiden, 1928		1989
	<i>Pseudo-nitzschia fraudulenta</i> (Cleve) Hasle, 1993		1989
	<i>Pseudo-nitzschia galaxiae</i> N.Lundholm & Ø.Moestrup, 2002		1989
	<i>Pseudo-nitzschia pungens</i> (Grunow ex Cleve) Hasle, 1993		1989
	<i>Pseudo-nitzschia seriata</i> (Cleve) H.Perag., 1899		1989
	<i>Pseudo-nitzschia subpacificica</i> (Hasle) Hasle, 1993		1989
	<i>Chaetoceros danicus</i> Cleve, 1889		1989
	<i>Coscinodiscus wailesii</i> Gran & Angst, 1931		1989
	<i>Asterionellopsis glacialis</i> (Castrac.) Round, 1990		1989
	<i>Cerataulina pelagica</i> (Cleve) Hendey, 1937		1989
	<i>Dactyliosolen fragilissimus</i> (Bergon) Hasle, 1996		1989
	<i>Guinardia delicatula</i> (Cleve) Hasle, 1997		1989
	<i>Guinardia flaccida</i> (Castracane) H.Perag., 1892		1989
	<i>Guinardia striata</i> (Stolterfoth) Hasle, 1996		1989
	<i>Proboscia alata</i> (Brightw.) Sundström, 1986		1989
	<i>Rhizosolenia imbricata</i> Brightw., 1858		1989
	<i>Rhizosolenia setigera</i> Brightw., 1858		1989
	<i>Rhizosolenia setigera f. pungens</i> (Cleve-Euler) Brunel, 1962		1989
	<i>Rhizosolenia styliiformis</i> T.Brightw., 1858		1989
<i>Skeletonema costatum</i> (Grev.) Cleve, 1873		1989	
<i>Thalassiosira levanderivan</i> Goor, 1924		1989	
<i>Thalassiosira minima</i> Gaarder, 1951		1989	
Ciliés (Ciliophora)	<i>Mesodinium rubrum</i> (Lohmann, 1908)		1989
Miozoa (Myzozoa)	<i>Ceratium tripos f. hiemale</i> Paulsen, 1907	Ceratium à cornes recourbées	1989
	<i>Tripos furca</i> (Ehrenberg) F.Gómez, 2013		1989
	<i>Tripos fusus</i> (Ehrenberg) F.Gómez, 2013		1989
	<i>Dinophysis acuminata</i> Clap. & J.Lachm., 1859		1989
	<i>Dinophysis acuta</i> Ehrenberg, 1839		1989
	<i>Dinophysis caudata</i> Saville-Kent, 1881		1989
	<i>Dinophysis fortii</i> Pav., 1924		1989
	<i>Dinophysis norvegica</i> Claparède & Lachmann, 1859		1989
	<i>Dinophysis sacculus</i> F.Stein, 1883		1989
	<i>Dinophysis tripos</i> Gouret, 1883		1989
	<i>Phalacroma rotundatum</i> (Claparède & Lachmann) Kof. & Michener, 1911		1989
	<i>Alexandrium andersonii</i> Balech		1989
	<i>Alexandrium catenella</i> (Whedon & Kof.) Balech, 1985		1989

	<i>Alexandrium margalefii</i> Balech, 1994		1989
	<i>Alexandrium ostenfeldii</i> (Paulsen) Balech & Tangen, 1985		1989
	<i>Alexandrium pseudogonyaulax</i> (Biecheler) Horiguchi ex K.Yuki & Y.Fukuyo, 1992		1989
	<i>Alexandrium tamarense</i> (Lebour, 1925) Balech, 1995		1989
	<i>Alexandrium tamutum</i> M.Montresor, A.Beran & U.John, 2004		1989
	<i>Gonyaulax spinifera</i> (Clap. & J.Lachm.) Diesing, 1866		1989
	<i>Lingulodinium polyedra</i> (F.Stein) J.D.Dodge, 1989		1989
	<i>Protoceratium reticulatum</i> (Clap. & J.Lachm.) Bütschli, 1885		1989
	<i>Amphidinium carterae</i> Hulburt, 1957		1989
	<i>Amphidinium herdmanii</i> Kofoid & Swezy, 1921		1989
	<i>Gyrodinium spirale</i> (Bergh) Kof. & Swezy, 1921		1989
	<i>Lepidodinium chlorophorum</i> (M.Elbrächter & E.Schnepf, 1996)		1989
	<i>Karenia brevis</i> (C.C.Davis) Gert Hansen & Moestrup, 2000		1989
	<i>Noctiluca scintillans</i> (Macartney) Kof. & Swezy, 1921	Noctiluque	1989
	<i>Peridinium quadridentatum</i> (F.Stein) Gert Hansen, 1995		1989
	<i>Archaeoperidinium minutum</i> (Kof.) Jørgensen, 1912		1989
	<i>Prorocentrum arcuatum</i> Issel, 1928		1989
	<i>Prorocentrum gibbosum</i> (Schiller) Schiller		1989
	<i>Prorocentrum lima</i> (Ehrenberg) F.Stein, 1878		1989
	<i>Prorocentrum micans</i> Ehrenberg, 1834		1989
	<i>Prorocentrum scutellum</i> Schröder, 1900		1989
	<i>Protoperidinium bipes</i> (Paulsen) Balech, 1974		1989
	<i>Protoperidinium depressum</i> (Bailey, 1854) Balech, 1974		1989
	<i>Protoperidinium diabolium</i> (Cleve) Balech, 1974		1989
	<i>Protoperidinium longipes</i> Balech, 1974		1989

Obs. : année de la dernière observation dans les bases de données de l'Ifremer

Espèces introduites				
Statut	Phylum	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Obs.
non R	Algues brunes (Ochrophyta)	<i>Pseudo-nitzschia multistriata</i> (Takano) Takano, 1995		1989
		<i>Heterosigma akashiwo</i> (Y.Hada) Y.Hada ex Y.Hara & M.Chihara, 1987		1989
	Miozoa (Myzozoa)	<i>Alexandrium affine</i> (H.Inoue & Y.Fukuyo) Balech, 1995	Alexandrium affine	1989
		<i>Karenia papilionacea</i> A.J.Haywood & K.A.Steindinger, 2004		1989
R	Algues brunes (Ochrophyta)	<i>Fibrocapsa japonica</i> S.Toriumi & H.Takano, 1973	Fibrocapse du Japon	1989
	Miozoa (Myzozoa)	<i>Alexandrium leei</i> Balech, 1985	Alexandrium de Lee	1989

INV	Miozoa (Myzozoa)	<i>Alexandrium minutum</i> Halim, 1960	Alexandrium nain INV	1989
*	Miozoa (Myzozoa)	<i>Karenia mikimotoi</i> (Miyake & Kominami ex Oda) Gert Hansen & Ø.Moestrup, 2000		1989

Statut : d'après Siorat F. (Coord.), 2010. Les espèces marines invasives en Bretagne. GIIP Bretagne environnement, 41 p. : « nonR » : reproduction non prouvée » / « R » : reproduction certaine / « INV » : invasive

*Espèce introduite non évaluée dans Siorat, 2010

Obs. : année de la dernière observation dans les bases de données de l'Ifremer

Annexe 3 - Méthodologie d'analyse de la patrimonialité des espèces faunistiques

Critères		Notation attribuée
Analyse à l'échelle européenne – toutes espèces disposant de listes de références		Maximum = 1
Espèce figurant en annexe II de la directive « Habitats, faune, flore » (DHFF) ou en annexe 1 de la directive « Oiseaux » (DO).		0,5
Espèces figurant sur la liste rouge européenne	Catégories vulnérable (VU), en danger d'extinction (EN) ou en danger critique d'extinction (CR).	1
	Catégorie quasi-menacée (NT).	0,5
Pour les oiseaux migrateurs – espèces atteignant le seuil international de l'espèce sur le site		1
Analyse à l'échelle nationale – toutes espèces disposant de listes de références		Maximum = 1
Espèces figurant sur la liste rouge nationale	Catégories vulnérable (VU), en danger d'extinction (EN) ou en danger critique d'extinction (CR).	1
	Catégorie quasi-menacée (NT).	0,5
Espèces protégée au niveau national		0,5
Analyse à l'échelle régionale – toutes espèces disposant de listes de références		Maximum = 1
Espèces figurant sur la liste rouge régionale	Catégories vulnérable (VU), en danger d'extinction (EN) ou en danger critique d'extinction (CR).	1
	Catégorie quasi-menacée (NT).	0,5
Espèce déterminante ZNIEFF		0,5
Espèce dont la responsabilité biologique régionale est évaluée comme majeure (5), très élevée (4) ou élevée (3).		1
Analyse à l'échelle départementale – oiseaux nicheurs		Maximum = 1
Responsabilité biologique départementale	Majeure (5), très élevée (4) ou élevée (3).	1
	Modérée (2).	0,5
Analyse à l'échelle locale – oiseaux nicheurs, mammifères, papillons diurnes, odonates, orthoptères		Maximum = 1
Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombres de mailles occupées en Bretagne)	> 10	1
	Compris entre 5 et 10	0,5

La majorité des groupes taxonomiques est donc évaluée aux échelles européenne, nationale et régionale. Un indice de responsabilité biologique départemental étant en cours d'élaboration pour les oiseaux nicheurs, l'échelle départementale a également pu être considérée pour ces espèces.

De plus, les oiseaux nicheurs, les mammifères, les papillons diurnes et les odonates disposent également d'atlas à l'échelle de la Bretagne, un indice de localité a donc pu être mesuré. L'atlas des orthoptères est en cours de réalisation, des cartes provisoires ont été diffusées en 2020. Ce même indice a donc également pu être calculé pour les orthoptères.

Le niveau d'enjeu est estimé selon les classes suivantes :

Enjeu	Majeur	Très fort	Fort	Modéré	Mineur
Notation générale (échelles européenne, nationale et régionale)					
Résultat	3	2,5	2	1,5	<1,5
Notation incluant l'indice de localité – mammifères, rhopalocères, odonates et orthoptères					
Résultat	[3,5 ; 4]	[2,5 ; 3]	2	1,5	<1,5
Notation incluant l'échelle départementale et locale – oiseaux nicheurs					
Résultats	[4,5 ; 5]	[3,5 ; 4]	[2,5 ; 3]	[1,5 ; 2]	<1,5

Annexe 4 – Liste des oiseaux nicheurs recensés sur le site

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	D O	LR UE	LR Fr	P. nat	ZNI EFF	LR Bzh	RB Bzh	RB 29	Ind Loc	Obs
Très fort	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'été		LC	VU		x	CR	4	3	31,5	2015
	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand gravelot		LC	VU	x	x	EN	5	3	28,8	2022
	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle lusciniôide		LC	EN	x	x	CR	5	3	19,2	2021
	<i>Anarynchus alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu	x	LC	VU	x	x	VU	4	2	10,8	2023
	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé		VU	NT		x	VU	3	2	10,8	2023
	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	x	LC	VU	x	x	RE			346,0	2019
	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe		LC	LC	x	x	CR	4	3	57,7	2023
	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches		LC	LC	x	x	EN	4	3	43,3	2023
	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux		LC	NT	x	x	EN	3	1	15,0	2022
	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Echasse blanche	x	LC	LC	x	x	VU	2	1	12,4	2022
	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	x	LC	LC	x	x	VU	2	2	10,2	2022
	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	x	LC	NT	x	x	EN	3	2	6,7	2023
	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	x	NT	EN	x	x	VU	4	2	2,8	2018
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois		VU	VU			VU	2	2	1,2	2022	

Fort	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	x	LC	VU	x	x				173,0	2019
	<i>Motacilla flava flavissima</i> (Blyth, 1834)	Bergeronnette flavéole		LC	LC	x	x	VU	3	2	24,7	2007
	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer		LC	LC	x	x	EN	3	2	16,5	2023
	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin	x	LC	LC	x	x		1	1	10,8	2022
	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré	x	LC	LC	x	x				346,0	2022
	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canard chipeau		LC	LC		x	EN	3	2	26,6	2023
	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot		LC	LC	x		EN	3	2	7,9	2018
	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse		LC	VU	x		VU	3	2	2,9	2023
	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux		LC	EN	x		VU	4	2	2,5	2022
	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune		LC	VU	x		EN	4	2	1,2	2022
	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe		LC	VU	x		VU	3	2	1,1	2022
Modéré	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré		LC	LC	x	x			1	6,3	2023
	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés		NT	LC		x		1	1	5,1	2021
	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche		LC	LC	x	x	VU	2	1	4,6	2021
	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachtée		LC	NT	x	x			1	3,7	2019
	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs		LC	LC	x	x	LC	3	1	3,6	2023
	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	x	LC	LC	x	x	LC	2	1	2,7	2022
	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine		LC	VU	x		NT	2	1	1,3	2020
	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique		LC	LC	x		VU	2	1	1,0	2022
	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau		LC	NT			NT	2	1	4,3	2023
	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée		LC	LC	x	x	LC	1	1	3,7	2023
	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Pipit maritime		LC	NT	x				2	3,5	2022
	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage		LC	LC	x	x			1	2,3	2023
	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule		NT	LC		x		1	1	2,0	2023
	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs		LC	VU	x				1	1,9	2023
	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti		LC	NT	x				1	1,8	2023

<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau		LC	LC	x	x	LC	2	1	1,7	2022
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini		LC	VU	x				1	1,6	2023
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé		LC	NT	x				1	1,3	2023
<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris		LC	LC	x		NT	2	1	1,3	2022
<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre		LC	NT	x		LC	2	1	1,2	2022
<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre		LC	NT	x				1	1,2	2023
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs		LC	LC			VU	3	1	1,2	2023
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse		LC	VU	x				1	1,1	2023
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant		LC	VU	x				1	1,1	2022
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle		LC	NT	x		LC	2	1	1,0	2023
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé		LC	LC	x				1	4,7	2023
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvatte		LC	LC	x	x			1	3,2	2022
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé		LC	LC	x	x			1	3,0	2023
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux		LC	LC	x	x			1	2,1	2023
<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte		LC	LC	x				1	1,9	2021
<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	Mésange nonnette		LC	LC	x		LC	2	1	1,7	2021
<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	Mésange huppée		LC	LC	x				1	1,4	2022
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie		LC	LC	x		LC	2	1	1,4	2011
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette		LC	LC	x				1	1,4	2022
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe		LC	LC	x		LC	2	1	1,4	2022
<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours		LC	LC	x				1	1,4	2023
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte		LC	LC	x		LC	2	1	1,3	2023
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot		LC	LC	x				1	1,3	2021
<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Roitelet triple-bandeau		LC	LC	x	x			1	1,3	2019
<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi		LC	LC	x				1	1,2	2022
<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins		LC	LC	x				1	1,2	2023
<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins		LC		x				1	1,2	2022
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue		LC	LC	x				1	1,1	2023

	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert		LC	LC	x		LC	2	1	1,1	2022
	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise		LC	LC	x				1	1,1	2022
	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière		LC	LC	x				1	1,1	2022
	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable		LC	LC	x				1	1,1	2023
	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Mésange bleue		LC	LC	x				1	1,0	2022
	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire		LC	LC	x				1	1,0	2023
	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet		LC	LC	x				1	1,0	2023
	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres		LC	LC	x				1	1,0	2022
	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familial		LC	LC	x				1	1,0	2023
	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon		LC	LC	x				1	1,0	2023
	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pxllot véloce		LC	LC	x				1	1,0	2023
	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise		LC	LC				1		9,9	2021
	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule poule-d'eau		LC	LC					1	1,3	2022
	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire		LC	LC					1	1,2	2023
	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert		LC	LC				2	1	1,2	2023
	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes		LC	LC			LC	2	1	1,2	2022
	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet		LC	LC			LC	2	1	1,2	2022
	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine		LC	LC					1	1,2	2022
	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde		LC	LC					1	1,1	2023
	<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)	Tourterelle turque		LC	LC					1	1,1	2019
	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne		LC	LC					1	1,1	2023
	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier		LC	LC					1	1,0	2023
	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir		LC	LC					1	1,0	2023
	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide		LC	LC						1,6	2022
Nicheurs anciens												
Très fort	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	x	LC	NT	x	x	CR	4	3		1981
Fort	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire		NT	VU		x	RE	4			2000
Modéré	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain	x	LC	EN	x	x					2001

Nicheurs occasionnels											
	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle									
EEE	<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	Canard carolin									2011

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce / « EEE » : espèce exotique envahissante

DO : Espèce inscrite à l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux » (2009)

LR UE : liste rouge européenne (2021)

LR Fr : liste rouge française des oiseaux reproducteurs de France métropolitaine (2016)

P.nat. : espèces protégées au niveau national (Arrêté du 29 octobre 2009)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des oiseaux migrateurs et hivernants de Bretagne (2015)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2015)

RB 29 : Responsabilité biologique départementale (en cours de développement / G. Guyot, comm pers.)

Ind loc. : Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombre de mailles occupées en Bretagne)

Obs : date de dernière observation sur le site

Annexe 5 - Liste des oiseaux migrateurs recensés sur le site

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	S	D	LR UE	LR Fr	P. nat	ZNI EFF	LR Bzh	RB Bzh	Obs
Majeur	<i>Puffinus mauretanicus</i> Lowe, 1921	Puffin des Baléares		x	CR	VU	x	x	LC	4	2022
	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Phragmite aquatique	x	x	VU	VU	x	x	VU	3	2023
Très fort	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire			NT	VU		x	NT	4	2023
	<i>Anarynchus alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu		x	LC	VU	x	x	VU	4	2023
	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling	x		LC	LC	x	x		4	2023
	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé			VU	NT		x	VU	3	2023
Fort	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle luscinioides			LC	EN	x	x	CR	5	2023
	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Plongeon imbrin		x	LC	VU	x	x	VU	5	2023
	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Spatule blanche		x	LC		x	x	EN	5	2022
	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	x	x	LC	LC				4	2023
	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand gravelot			LC	VU	x	x	VU	4	2023
	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'été			LC	VU		x	CR	4	2023
	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré		x	LC		x	x	CR	4	2022
	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Harle huppé			NT	LC	x	x	NT	4	2019
	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette		x	LC		x		EN	3	2023
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu			LC	VU				3	2023	

	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux			LC	NT	x	x	EN	2	2023
	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Echasse blanche		x	LC	LC	x	x	VU	2	2023
	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain		x	LC	EN	x	x			2017
	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée		x	LC	VU	x	x			2022
	<i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	Pluvier guignard		x	LC	NT	x	x			2022
	<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Macareux moine			EN		x	x			2023
	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1760)	Pétrel fulmar			VU		x	x			2023
Mod éré	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Fuligule milnhan			LC	NT		x	EN	5	2023
	<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	Puffin des Anglais			LC		x	x	VU	5	2022
	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant			LC		x	x	LC	4	2021
	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Grèbe à cou noir			LC		x	x	LC	4	2022
	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Tournepièrre à collier			LC	LC	x	x	LC	4	2023
	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Barge rousse		x	LC	LC		x	LC	4	2022
	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré			NT	LC		x		4	2023
	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau variable			LC	LC	x	x	NT	4	2023
	<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764)	Bécasseau violet			LC		x	x		4	2023
	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran			LC	LC	x	x		4	2023
	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe			LC	LC	x	x	CR	4	2023
	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse			LC		x	x	LC	3	2023
	<i>Motacilla flava flavissima</i> (Blyth, 1834)	Bergeronnette flavéole			LC	LC	x	x	VU	3	2021
	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	Guillemot de Troil		x	LC		x	x		2	2023
	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale		x	LC		x	x		2	2023
	<i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813	Sterne de Dougall		x	LC	NT	x	x		2	2018
	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés			LC	VU	x	x		2	2022
	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière			LC	LC	x	x	VU	2	2023
<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Plongeon arctique		x	LC		x	x		2	2023	
<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Plongeon catmarin		x	LC		x	x		2	2023	

<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon			NT	NT		x		1	2023
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Labbe parasite			EN	LC	x			1	2022
<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Pétrel tempête		x	LC		x	x		1	2016
<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787)	Sterne caugek		x	LC	LC	x	x		1	2023
<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine		x	LC	LC	x	x		1	2022
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin		x	LC	LC	x	x		1	2023
<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé		x	LC		x	x			2023
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré		x	LC		x	x			2023
<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir		x	LC		x	x			2022
<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau cocorli			VU	LC	x				2023
<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir		x	LC		x	x			2022
<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Bruant ortolan		x	LC	EN	x				2022
<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire		x	LC	VU	x				2022
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon		x	VU			x			2023
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe		x	LC	VU	x				2023
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal		x	LC	VU	x				2022
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde			LC	VU	x	x			2022
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette		x	LC		x	x			2023
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu		x	LC	LC	x	x			2022
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur		x	LC	LC	x	x			2022
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore		x	LC	LC	x	x			2022
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux		x	LC		x	x			2023
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin		x	LC		x	x			2023
<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Chevalier sylvain		x	LC	LC	x	x			2022
<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche		x	LC		x	x			2022
<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eider à duvet			EN			x			1999
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin		x	LC		x	x			2023

	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire		x	LC		x	x			2022
	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais		x	LC		x	x			2008
	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir		x	LC		x	x			2022
	<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Pallas, 1776)	Mouette pygmée		x	LC	LC	x	x			2023
	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedicnème criard		x	LC		x	x			2018
	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Outarde canepetière		x	VU		x				2018
	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur		x	LC		x	x			2022
	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	Sterne caspienne		x	LC	NT	x				2022
	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie			VU			x		4	2023
	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau maubèche			LC	NT			LC	4	2022
	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette			LC	LC		x	LC	4	2023
	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté			LC	LC		x	LC	4	2023
	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse noire			LC	LC		x		4	2023
	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin			VU	LC		x	EN	3	2023
	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet			LC	LC		x	VU	3	2022
	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois			LC	LC		x		3	
	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canard chipeau			LC	LC		x	EN	3	2023
	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Canard siffleur			LC	LC		x		3	2023
	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot à oeil d'or			LC			x	EN	3	2023
	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais		x	VU			x		2	2023
	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau			LC	NT			NT	2	2023
	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	x		LC	LC	x	x	LC	2	2023
	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage			LC		x	x		2	2023
	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Mouette tridactyle			LC		x	x		2	2023
	<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758	Pingouin torda			LC		x	x		2	2023
	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle			LC	NT	x		LC	2	2023
	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver			LC	LC		x	CR	2	2023
	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun			LC		x	x	LC	1	2023

<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré			LC		x	x	LC	1	2023
<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule			NT			x		1	2023
<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	Sterne arctique		x	LC	LC	x			1	2022
<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse brune			VU	EN					2023
<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches			LC		x	x			2023
<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée			LC		x	x			2022
<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée			LC		x	x			2023
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvatte			LC		x	x			2023
<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau			LC		x	x			2023
<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Roitelet triple-bandeau			LC		x	x			2023
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois			VU						2022
<i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier combattant		x	LC	NT					2023
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc			LC	LC	x	x			2023
<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1760)	Cormoran huppé			LC		x	x			2023
<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde			LC		x	x			2023
<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté			LC		x	x			2023
<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand corbeau			LC		x	x			2022
<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron			LC		x	x			2022
<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)	Pétrel cul-blanc		x	LC		x				2022
<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec étroit		x	LC		x				2020
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe			LC		x	x			2022
<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Bernache nonette		x	LC		x				2022
<i>Actitis hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Chevalier guignette			LC		x	x			2023
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Crabier chevelu		x	LC		x				2022
<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	Élanion blanc		x	LC		x				2021
<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	Guifette moustac		x	LC		x				2023
<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Ibis falcinelle		x	LC		x				2022
<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche à tête rousse			NT		x				2021

<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline		x	LC		x				2011
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli			LC		x	x			2020
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline			LC		x	x			2023
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc			LC	LC	x	x			2022
<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon			LC	LC	x	x			2023
<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier			LC	LC	x	x			2022
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux			LC	LC	x	x			2023
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé			LC	LC	x	x			2023
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré			LC	LC	x	x			2023
<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Marouette de Baillon		x	LC		x				2017
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse			LC		x			2	2023
<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre			LC		x			2	2023
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir			LC		x			2	2023
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres			LC		x			2	2022
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes			LC		x			2	2022
<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Bécassine sourde		x	LC					2	2023
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe			LC	LC	x		LC	2	2023
<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Pinson du Nord			LC		x			2	2022
<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle			LC	LC	x			2	2023
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis			LC		x			2	2022
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Canard souchet			LC	LC		x		1	2023
<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	Labbe pomarin			LC	LC	x			1	2021
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot			LC		x				2023
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés			LC			x			2021
<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Pipit maritime			LC		x				2023
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux			LC		x				2023
<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolais polyglotte			LC		x				2021

<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini			LC		x				2023
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grissette			LC		x				2023
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé			LC		x				2023
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine			LC		x				2023
<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris			LC		x				2023
<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre			LC		x				2023
<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins			LC		x				2022
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant			LC		x				2023
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise			LC		x				2023
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres			LC		x				2023
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier			LC		x				2023
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce			LC		x				2023
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux			LC		x				2022
<i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809)	Fuligule à bec cerclé			LC		x				2023
<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	Goéland bourgmestre			LC		x				2022
<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Goéland leucopnée			LC		x				2023
<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	Mésange noire			LC		x				2021
<i>Anser brachyrhynchus</i> (Baillon, 1833)	Oie à bec court			LC		x				2020
<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Müller, 1776)	Pluvier bronzé			LC		x				2022
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée			LC	LC		x			2022
<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau de Temminck			LC		x				2022
<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau minute			LC	LC	x				2022
<i>Tryngites subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau rousset					x				2022
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau tacheté					x				2022
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins			LC		x				2015
<i>Motacilla alba yarrellii</i> Gould, 1837	Bergeronnette de Yarrell					x				2023
<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des neiges			LC		x				2022
<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant lapon			LC		x				2020

<i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776	Bruant nain			LC		x				2022
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé			LC	LC	x				2023
<i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758)	Fou de Bassan			LC		x				2023
<i>Aythya affinis</i> (Eyton, 1838)	Fuligule à tête noire					x				2023
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris			LC		x				2022
<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir			LC		x				2022
<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764)	Grand Labbe			LC	LC	x				2022
<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Guifette leucoptère			LC		x				2021
<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Harle bièvre			LC	LC	x				2007
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc			LC		x				2022
<i>Locustella certhiola</i> (Pallas, 1811)	Locustelle de Pallas					x				2018
<i>Sturnus roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Martin roselin			LC		x				2021
<i>Setophaga striata</i> (Forster, 1772)	Paruline rayée					x				2021
<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec large			LC		x				2023
<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise			LC		x				2022
<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Pipit à gorge rousse			LC		x				2021
<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818	Pipit de Richard					x				2022
<i>Pluvialis fulva</i> (Gmelin, 1789)	Pluvier fauve			LC		x				2022
<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	Pouillot à grands sourcils			LC		x				2019
<i>Phylloscopus fuscatus</i> (Blyth, 1842)	Pouillot brun			LC		x				2022
<i>Phylloscopus collybita tristis</i> Blyth, 1843	Pouillot de Sibérie			LC		x				2022
<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle			LC	LC	x				2022
<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir			LC	LC	x				2023
<i>Acrocephalus agricola</i> (Jerdon, 1845)	Rousserolle isabelle			LC		x				2022
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert			LC	LC				2	2023
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs			LC					1	2023
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne			LC					1	2023
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis			LC					1	2023

Annexe 6 - Liste des oiseaux hivernants recensés sur le site

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	S	D	LR UE	LR Fr	P. nat	ZNI EFF	LR Bzh	RB Bzh	Obs
Très fort	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Plongeon imbrin		x	LC	VU	x	x	VU	5	2023
	<i>Anarynchus alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu		x	LC	VU	x	x	VU	4	2023
	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Grèbe à cou noir			VU	LC	x	x	LC	4	2022
	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire			NT	VU		x	NT	4	2023
	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling	x		LC	LC	x	x		4	2023
	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé			VU	NT		x	VU	3	2023
Fort	<i>Puffinus mauretanicus</i> Lowe, 1921	Puffin des Baléares		x	CR		x	x	LC	4	2022
	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	x	x	LC	LC				4	2023
	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette			VU	LC		x	EN	4	2023
	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux			LC	EN	x		VU	4	2023
	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie			VU			x		4	2023
	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette		x	LC	LC	x		EN	3	2023
	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milxn			VU	LC		x	EN	3	2023
	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet			VU	LC		x	VU	3	2022
	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu			LC	VU				3	2023
	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou		x	NT		x	x			2022
	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand gravelot			LC	VU	x	x	VU		2023
	<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse brune			VU	EN					2023
	<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Macareux moine			EN		x	x			2023
	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1760)	Pétrel fulmar			VU		x	x			2023
Modéré	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Fuligule milxnan			LC	NT		x	EN	5	2023
	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Barge rousse		x	LC	LC		x	LC	4	2022
	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches			LC	LC	x	x	EN	4	2023
	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau variable			LC	LC	x	x	NT	4	2023
	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant			LC	LC	x	x		4	2021
	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran			LC	LC	x	x		4	2023
	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré			NT	LC		x		4	2023
	<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764)	Bécasseau violet			LC		x	x		4	2023

<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Tournepierre à collier			LC		x	x		4	2023
<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer			LC	LC	x	x	EN	3	2023
<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon			LC	LC	x	x	LC	3	2023
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse			LC	LC	x	x		3	2023
<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	x		LC		x	x		2	2023
<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	Guillemot de Troil	x		LC		x	x		2	2023
<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corbeau freux			VU	LC		x	LC	1	2023
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon			NT	NT		x		1	2023
<i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier combattant	x		NT	NT					2023
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	x		LC	VU	x				2023
<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	x		LC		x	x			2022
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	x		LC		x	x			2023
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	x		LC		x	x			2023
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	x		LC		x	x			2023
<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	x		LC		x	x			2023
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	x		LC		x	x			2023
<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	x		LC		x	x			2008
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon	x		VU			x			2023
<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eider à duvet			EN			x			1999
<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse noire			LC	LC		x		4	2023
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté			LC	LC		x		4	2023
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau maubèche								4	2022
<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canard chipeau			LC	LC		x	EN	3	2023
<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot à oeil d'or			LC			x	EN	3	2023
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois			LC	LC		x		3	
<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Canard siffleur			LC	LC		x		3	2023
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	x		VU			x		2	2023
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver			LC	LC		x	CR	2	2023

<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau			LC	NT			NT	2	2023
<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758	Pingxn torda			LC		x	x		2	2023
<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré			LC	LC	x	x	LC	1	2023
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun			LC	LC	x	x		1	2023
<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule			NT			x		1	2023
<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Ibis falcinelle	x		LC		x				2022
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc			LC	LC	x	x			2023
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux			LC	LC	x	x			2023
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé			LC	LC	x	x			2023
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré			LC	LC	x	x			2023
<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche			LC		x	x			2021
<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Roitelet triple-bandeau			LC		x	x			2023
<i>Actitis hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Chevalier guignette			LC		x	x			2023
<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté			LC		x	x			2023
<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand corbeau			LC		x	x			2022
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline			LC		x	x			2023
<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Bécassine sourde	x		LC					2	2023
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe			LC	LC	x		LC	2	2023
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse			LC		x			2	2023
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes			LC		x			2	2022
<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Pinson du Nord			LC		x			2	2022
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-boeufs			LC		x		NT	1	2023
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Canard souchet			LC	LC		x		1	2023
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois			LC	LC		x			2022
<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau minute			LC	LC	x				2022
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé			LC	LC	x				2023
<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir			LC	LC	x				2023
<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Pipit maritime			LC		x				2023
<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs			LC		x				2023
<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti			LC		x				2023
<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	Mésange nonnette			LC		x				2021
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini			LC		x				2023

<i>Parus cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée			LC		x				2023
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie			LC		x				2023
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte			LC		x				2023
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé			LC		x				2023
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine			LC		x				2023
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot			LC		x				2022
<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi			LC		x				2023
<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre			LC		x				2023
<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins			LC		x				2023
<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune			LC		x				2023
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue			LC		x				2023
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse			LC		x				2023
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert			LC		x				2023
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant			LC		x				2023
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise			LC		x				2023
<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe			LC		x				2023
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière			LC		x				2023
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable			LC		x				2023
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire			LC		x				2023
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet			LC		x				2023
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle			LC		x				2023
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique			LC		x				2023
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres			LC		x				2023
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier			LC		x				2023
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon			LC		x				2023
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic epeiche			LC		x				2023
<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic epeichette			LC		x				2022
<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des neiges			LC		x				2022
<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant lapon			LC		x				2020

<i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758)	Fou de Bassan			LC		x				2023
<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Goéland leucophée			LC		x				2023
<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Goéland marin			LC		x				2023
<i>Motacilla alba yarrellii</i> Gould, 1837	Bergeronnette de Yarrell					x				2023
<i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809)	Fuligule à bec cerclé					x				2023
<i>Aythya affinis</i> (Eyton, 1838)	Fuligule à tête noire					x				2023
<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle			LC		x		LC	2	2023
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert			LC	LC				2	2023
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs			LC	LC				1	2023
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier			LC	LC				1	2023
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne			LC	LC				1	2023
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis			LC	LC				1	2023
<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours			LC		x		LC		2023
<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Mésange bleue			LC		x		LC		2023
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet			LC	LC					2023
<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Chevalier aboyeur			LC	LC					2023
<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Nette rousse			LC	LC					2022
<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise			LC						2022
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide			LC						2023
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule poule-d'eau			LC						2023
<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire			LC						2023
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes			LC						2023
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine			LC						2023
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde			LC						2023
<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque			LC						2023
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne			LC						2023
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir			LC						2023
<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Harelde de Miquelon			LC						2020
Hivernants occasionnels										
<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Crave à bec rouge									2020
<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Cygne chanteur	x		LC						2022

<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)	Cygne de Bewick									2007
<i>Larus glaucoides</i> Meyer, 1822	Goéland à ailes blanches									2018
<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	Goéland bourgmestre			LC		x				2022
<i>Larus glaucoides kumlieni</i> Brewster, 1883	Goéland de Kumlien									2014
<i>Larus smithsonianus</i> Coues, 1862	Goéland hudsonien									2021
<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	Goéland pontique			LC		x				2023
<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe esclavon									2007
<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Grèbe jougris									2007
<i>Coccythraustes coccythraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux									2007
<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Grue cendrée									2011
<i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	Harle piette									2010
<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc									1977
<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs icterine									2007
<i>Anser caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	Oie des neiges									1987
<i>Porphyrio porphyrio</i> (Linnaeus, 1758)	Poule sultane									1972
<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts									2007
<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Roselin cramoisi									2007
<i>Anas discors</i> Linnaeus, 1766	Sarcelle à ailes bleues									2011
<i>Anas formosa</i> Georgi, 1775	Sarcelle élégante									1970
<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé									2008
<i>Sterna nilotica</i> Gmelin, 1789	Sterne hansel									2007
<i>Oenanthe isabellina</i> (Temminck, 1829)	Traquet isabelle									1998
<i>Anas crecca carolinensis</i> Gmelin, 1789	Sarcelle à ailes vertes		x							2023
Hivernants introduits										
<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge									2007

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

S.I. : seuil international atteint par l'espèce

DO : Espèce inscrite à l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux » (2009)

LR UE : liste rouge européenne (2021)

LR Fr : liste rouge française des oiseaux de France métropolitaine de passage (2016)

P.nat. : espèces protégées au niveau national (Arrêté du 29 octobre 2009)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des oiseaux migrateurs et hivernants de Bretagne (2015)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2015)

Annexe 7 - Liste des odonates recensés sur le site

Enj- eu	Espèce	Nom vernaculaire	DH FF	LR UE	LR Fr	LR Bzh	ZNI EFF	RB Bzh	Ind loc.	Obs
Très fort	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Agrion joli		LC	VU	EN	x	4	5,2	2016
Fort	<i>Aeschna isoceles</i> (O.F. Müller, 1767)	Aeschne isocèle		LC	LC	EN	x	3	15,7	2022
	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Leste dryade		LC	LC	EN	x	3	3,8	2021
	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	Leste fiancé		LC	NT	LC		1	2,2	2022
	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	Gomphe joli		NT	LC	LC		1	1,2	2018
	<i>Hemianax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	Anax porte-selle		LC	NA	NA	NA	NA	8,5	2013
	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympétrum de Fonscolombe		LC	LC	LC		1	2,1	2022
	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	Leste sauvage		LC	LC	LC		1	2,0	2022
	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	Leste verdoyant		LC	LC	LC		1	2,8	2022
	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Leste brun		LC	LC	LC		1	2,1	2022
	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert		LC	LC	LC		1	1,1	2022
	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon		LC	LC	LC		1	1,4	2022
	<i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)	Agrion de Vander Linden		LC	LC	LC		1	1,2	2022
	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naiade au corps vert		LC	LC	LC		1	2,0	2022
	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain		LC	LC	LC		1	2,6	2004
	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle		LC	LC	LC		1	1,1	2022
	<i>Ceriagrion tenellum</i> (Villers, 1789)	Agrion délicat		LC	LC	LC		1	1,3	2022
	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe		LC	LC	LC		1	1,1	2022
	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Agrion à larges pattes		LC	LC	LC		1	1,3	2016
	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant		LC	LC	LC		1	1,0	2022
	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Petite nymphe au corps de feu		LC	LC	LC		1	1,1	2022
	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastré annelé		LC	LC	LC		1	1,3	2022
	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	Aeschne affine		LC	LC	LC		1	2,6	2022
	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Aeschne mixte		LC	LC	LC		1	1,4	2022
	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschne bleue		LC	LC	LC		1	1,1	2022
	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschne printanière		LC	LC	LC		1	2,7	2022
	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Anax empereur		LC	LC	LC		1	1,1	2022
	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	Crocothémis écarlate		LC	LC	LC		1	1,3	2022
	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	Libellule fauve		LC	LC	LC		1	1,5	2022
	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	Sympétrum méridional		LC	LC	LC		1	1,5	2022
	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Libellule déprimée		LC	LC	LC		1	1,1	2022

	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Libellule à quatre taches		LC	LC	LC		1	1,2	2022
	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuissant		LC	LC	LC		1	1,5	2022
	<i>Orthétrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun		LC	LC	LC		1	2,4	2021
	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé		LC	LC	LC		1	1,1	2022
	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	Sympétrum sanguin		LC	LC	LC		1		2022
	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Sympétrum strié		LC	LC	LC		1		2022
	<i>Calopteryx splendens splendens</i> (Harris, 1780)	Caloptéryx éclatant		LC	LC	LC		1	1,2	2022
	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge		LC	LC	LC		1	1,1	2022

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : liste rouge européenne (2009)

LR Fr : liste rouge française des odonates de France métropolitaine (2016)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des odonates de Bretagne (2019)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2019)

Ind loc. : Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombre de mailles occupées dans le grand-Ouest), Atlas des libellules de Bretagne à la Vendée (2023)

Obs. : Date de dernière observation sur le site

Annexe 8 - Liste des lépidoptères recensés sur le site

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DH FF	LR UE	LR Fr	Prot nat.	ZNI EFF	LR Bzh	RB Bzh	Ind loc.	Obs
Rhopalocères											
Fort	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Collier argenté		LC	NT		x	EN	3	9,3	2017
	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des Potentilles		LC	LC		x	EN	3	13,6	2019
	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym		LC	LC		x	EN	3	15,4	2019
	<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré		LC	LC		x	EN	3	29,5	2018
Modéré	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc		LC	LC		x	EN	3	8,9	2010
	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette		LC	LC		x	NT	1	4,5	2015
	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir		LC	LC		x	NT	2	2,2	2015
	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste		LC	LC		x	NT	2	3,2	2019
	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Hespérie du Chiendent		NT	LC			LC	2	3,2	2014
	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée		LC	LC			LC	1	1,8	2011
	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie		LC	LC			LC	1	1,6	2019
	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine		LC	LC			LC	1	1,1	2011

<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle		LC	LC			LC	1	1,3	2011
<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque		LC	LC			LC	1	1,5	2016
<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de- corail		LC	LC			LC	1	1,3	2020
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce		LC	LC			LC	1	1,5	2019
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns		LC	LC			LC	1	1,1	2019
<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Cuivré commun		LC	LC			LC	1	1,1	2020
<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Chêne		LC	LC			LC	1	1,8	2009
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane		LC	LC			LC	1	1,1	2010
<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Bouleau		LC	LC			LC	1	1,8	2016
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon		LC	LC			LC	1	1,1	2022
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore		LC	LC			LC	1	1,1	2020
<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci		LC	LC			LC	1	1,1	2018
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron		LC	LC			LC	1	1,1	2017
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou		LC	LC			LC	1	1,0	2020
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Navet		LC	LC			LC	1	1,1	2020
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride de la Rave		LC	LC			LC	1	1,0	2019
<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour		LC	LC			LC	1	1,0	2019
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue		LC	LC			LC	1	1,2	2015
<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique		LC	LC			LC	1	1,2	2017
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne		LC	LC			LC	1	1,4	2019
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun		LC	LC			LC	1	1,1	2020
<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré		LC	LC			LC	1	2,1	2010
<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère		LC	LC			LC	1	1,1	2019
<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain		LC	LC			LC	1	1,3	2019
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil		LC	LC			LC	1	1,0	2019
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil		LC	LC			LC	1	1,1	2019
<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain		LC	LC			LC	1	2,6	2021
<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis		LC	LC			LC	1	1,0	2020
<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma		LC	LC			LC	1	1,1	2017

<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis		LC	LC			LC	1	1,0	2020
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain		LC	LC			LC	1	1,0	2020
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons		LC	LC			LC	1	1,1	2019
<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du Trèfle		LC	LC			LC	2	1,8	2014
<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue		LC	LC			LC	2	4,7	2005
<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux		LC	LC			LC	2	1,4	2016
<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant		LC	LC			LC	2	3,0	2015

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : liste rouge européenne (2010)

LR Fr : liste rouge française des odonates de France métropolitaine (2012)

Prot. Nat. : Espèce protégée à l'échelle nationale (2007)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des rhopalocères de Bretagne (2018)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2018)

Ind loc. : Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombre de mailles occupées dans le grand-Ouest), Atlas des papillons diurnes de Bretagne (2017)

Obs. : Date de dernière observation sur le site

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Obs.
Hétérocères		
<i>Abraxas grossulariata</i> (Linnaeus, 1758)	Zérène du Groseillier	2020
<i>Agrotis agathina</i> (Duponchel, 1828)	Noctuelle agathine	1910
<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	Point d'Exclamation	2010
<i>Agrotis puta</i> (Hübner, 1803)	Noctuelle des Renouées	2010
<i>Agrotis vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)	Porte-Flèches	2009
<i>Anania verbascalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Botys du bouillon-blanc	2009
<i>Anthophila fabriciana</i> (Linnaeus, 1767)		2017
<i>Apamea remissa</i> (Hübner, 1809)	Brouillée	2010
<i>Aporophyla australis</i> (Boisduval, 1829)	Xyline australe	2004
<i>Aspitates ochrearia</i> (Rossi, 1794)	Aspilate ochracée	2004
<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma	2020
<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène du Bouleau	2010
<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Cabère pustulée	2010
<i>Callistege mi</i> (Clerck, 1759)	Mi	2007
<i>Callopietria juvenina</i> (Stoll in Cramer, 1782)	Noctuelle de la Fougère	2020
<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	Brocatelle d'or	2010
<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	Petite Epine	2009
<i>Cleorodes lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	Boarmie des Lichens	2009
<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	Cidarie verdâtre	2010
<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	Cossus gâte-bois	2019
<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène de la Mancienne	2010

<i>Cryphia muralis</i> (Forster, 1771)	Bryophile du Lichen	2009
<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sphinx de la Vigne	2010
<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Sphinx de la Vigne	2010
<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)	Noctuelle de la Primevère	2010
<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	Noctuelle belle	2004
<i>Dolicharthria punctalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Sténie pontuée	2010
<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie crépusculaire	2020
<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	Manteau à tête jaune	2010
<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	Lithosie ocre	2010
<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée	2010
<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	Ennomos du Tilleul	2020
<i>Epirrhoe alternata</i> (O.F. Müller, 1764)	Alternée	2009
<i>Epirrhoe galiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélanthie du Caille-Lait	2009
<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1761)	Cidarie agate	2010
<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759)	Eupithécie de l'Absinthe	2010
<i>Eupithecia phoeniceata</i> (Rambur, 1834)	Eupithécie du Cyprès	2009
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée	2011
<i>Euproctis similis</i> (Fuessly, 1775)	Cul-doré	2020
<i>Eurrhpara hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	Botys de l'ortie	2010
<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	Buveuse	2010
<i>Euxoa tritici</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuelle cryptée	2010
<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)	Harpie fourchue	2010
<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	Feuille-Morte du Chêne	2010
<i>Gastropacha quercifolia quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)		2020
<i>Gnophria quadra</i> (Linnaeus, 1758)	Lithosie quadrille	1899
<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	Râtissée	2010
<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuelle dentine	2010
<i>Hadena perplexa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle carpophage	2010
<i>Heliothis virescens</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle de la Cardère	2010
<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	Noctuelle de la Morgeline	2010
<i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg & Borgström, 1784)	Larentie lavée	2010
<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799)	Acidalie dégénérée	2010
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Acidalie ocreuse	2004
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Acidalie blanchâtre	2010
<i>Jodis lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	Hémithée éruginée	2010
<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle du Genêt	2010
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne	2020
<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit minime à bande	2009
<i>Laspeyria flexula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crochet	2020
<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure entrecoupée	2010
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Philobie alternée	2010
<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx de la Ronce	2010
<i>Menophra abruptaria</i> (Thunberg, 1792)	Boarmie pétrifiée	2020
<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle furoncule	2010
<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Point blanc	2009

<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	Leucanie blafarde	2010
<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Leucanie orbicole	2010
<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou	2010
<i>Nola confusalis</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Nole crêtée	2010
<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nomophile	2010
<i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	Bois-Veiné	2010
<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	Cordon blanc	2010
<i>Odonestis pruni pruni</i> (Linnaeus, 1758)		2020
<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)	Ilythie incarnat	2009
<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	Citronnelle rouillée	2020
<i>Pammene aurana</i> (Fabricius, 1775)		2010
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie rhomboïdale	2009
<i>Perinephela lancealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Pyrale de l'Eupatoire	2010
<i>Perizoma flavofasciata</i> (Thunberg, 1792)	Périzome décolorée	2010
<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	Phalène de l'Aquiline	2010
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	Porcelaine	2020
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille cramoisie	2010
<i>Phragmatobia fuliginosa fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)		2020
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	Plusie de la Fétuque	2020
<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	Museau	2010
<i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)	Pyrauste du plantain	2010
<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	Pyrauste pourprée	2010
<i>Pyropteron chrysidiforme</i> (Esper, 1782)	Sésie de l'Oseille	2021
<i>Scoparia pyralella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Eudorée des vergers	2010
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Phalène rougeâtre	2009
<i>Sitochroa palealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Botys verdâtre	2010
<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille tigrée	2010
<i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille striée	2007
<i>Synanthedon tipuliformis</i> (Clerck, 1759)	Sésie du Groseillier	2004
<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775)	Clédéobie étroite	2010
<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	Octogésime	2010
<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Processionnaire du Pin	2020
<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	Batis	2010
<i>Timandra comae</i> Schmidt, 1931	Timandre aimée	2009
<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	Goutte-de-sang	2007
<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle en deuil	2004
<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	C-noir	2009
<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Trimaculée	2009
<i>Yponomeuta cagnagella</i> (Hübner, 1813)		2010
<i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1760)	Zeuzère du Marronnier	2005
<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygène du Pied-de-Poule	2004
<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	Zygène des prés	2007

Annexe 9 – Liste des orthoptères recensés sur le site

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DH FF	LR UE	LR Fr	P. nat.	LR DN	Dét. Bzh	Ind. Loc.	Obs
Très fort	<i>Pseudochorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	Criquet palustre		LC	3		1	x	17,04	2015
	<i>Chorthippus armoricanus</i> (Default, 2015)	Criquet des Ajoncs			2		1	x	5,21	2019
Fort	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	Sténobothre nain		LC	4		2	x	10,55	2022
	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	Conocéphale des Roseaux			3		2	x	1,76	2022
Modéré	<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	Oedipode émeraude		LC	4		4	x	5,91	2022
	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)	Courtillière commune		LC	4		2	x	4,06	2022
	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	Gomphocère tacheté		LC	4		3	x	4,71	2022
	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	Criquet de la Palène		LC	4		4	x	24,61	2022
	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet ensanglanté		LC	4		3	x	2,01	2022
	<i>Euchorthippus elegantulus</i> Zeuner, 1940	Criquet blafard		LC	4		4		6,33	2021
	<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolívar, 1887)	Tétrix des vasières		LC	4		4	x	3,10	2022
	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux		LC	4		4	x	3,08	2021
	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	Criquet marginé		LC	4		4		1,44	2022
	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux		LC	4		4		1,10	2022
	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste		LC	4		4		1,39	2022
	<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures		LC	4		4		1,11	2015
	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré		LC	4		4		1,17	2022
	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre		LC	4		4		1,14	2022
	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée		LC	4		4		1,33	2022
	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	Grillon des bois			4		4		1,26	2020
	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie		LC	4		4		3,33	2022
	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	Oedipode turquoise		LC	4		4		2,07	2022
	<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée		LC	4		4		1,20	2022
	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre		LC	4		4		2,24	2022
	<i>Tessellana tessellata</i> (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée		LC	4		4		2,27	2017
	<i>Roeseliana roeselii roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée		LC					1,16	2022

	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	Tétrix riverain		LC	4		4		4,14	2017
	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	Tétrix forestier		LC	4		4		1,51	2010
	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte		LC	4		4		1,11	2022

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : liste rouge européenne (2016)

LR Fr : Les orthoptères menacés en France - liste rouge nationale et listes rouges par domaine biogéographique (2004). 1 : espèces proches de l'extinction ou déjà éteintes / 2 : espèces fortement menacées d'extinction / 3 : espèces menacées, à surveiller / 4 : espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances.

Prot. Nat. : Espèce protégée à l'échelle nationale (2007)

LR DN : Les orthoptères menacés en France - liste rouge nationale et listes rouges par domaine biogéographique (2004) – domaine néморal

Dét. Bzh : Critères liés à la liste provisoire des espèces déterminantes d'orthoptères de Bretagne (1999) - Chevrier *et al.* 2004.

Ind loc. : Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombre de mailles occupées en Bretagne). Atlas de répartition provisoire des orthoptères, phasmes, mantes et forficules de Bretagne (2020)

Obs. : Date de dernière observation sur le site

Annexe 10 – Liste des arachnides recensés sur le site

Nom scientifique	Nom vernaculaire	LR Fr	Obs.
<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	Épeire de velours		2006
<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1758)	Agélène à labyrinthe		2009
<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873			2010
<i>Agroeca inopina</i> O. Pickard-Cambridge, 1886			2010
<i>Agroeca lusatica</i> (L. Koch, 1875)			2004
<i>Agroeca proxima</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			2004
<i>Agyneta affinis</i> (Kulczynski, 1898)			1995
<i>Agyneta mollis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			2010
<i>Agyneta rurestris</i> (C. L. Koch, 1836)			2010
<i>Alopecosa barbipes</i> (Sundevall, 1833)			2004
<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1758)	Lycose renard		2010
<i>Amaurobius erberi</i> (Keyserling, 1863)			1995
<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)	Amaurobe féroce		1995
<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)			2001
<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)			2006
<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	Hahnie élégante		2010
<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	Anyphène à chevrons		2009
<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	Épeire diadème		2010
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)			2010
<i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1799)			2004
<i>Argenna subnigra</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)			2010
<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Épeire frelon		2012

<i>Attulus saltator</i> (O. Pickard-Cambridge in Simon, 1869)			2004
<i>Atypus affinis</i> Eichwald, 1830	Mygales à chaussette		2010
<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	Aulonie mains-blanches		2010
<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)			2006
<i>Bathypantes approximatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			1905
<i>Bathypantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)			2010
<i>Brigittea latens</i> (Fabricius, 1775)	Dictyne cachée		1996
<i>Centromerita bicolor</i> (Blackwall, 1833)			1994
<i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)			1995
<i>Centromerus dilutus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)			2010
<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)			1905
<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)			2010
<i>Ceratinella scabrosa</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			1905
<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)			1996
<i>Civzelotes civicus</i> (Simon, 1878)			2010
<i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841			2010
<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839			2010
<i>Clubiona diversa</i> O. Pickard-Cambridge, 1862			1994
<i>Clubiona neglecta</i> O. Pickard-Cambridge, 1862			2006
<i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843			2006
<i>Clubiona reclusa</i> O. Pickard-Cambridge, 1863			2004
<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897			1996
<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)			2010
<i>Collinsia inerrans</i> (O. Pickard-Cambridge, 1885)			2006
<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)			1994
<i>Crustulina sticta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)			2006
<i>Diplocephalus permixtus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			1905
<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)			2010
<i>Drassodes cupreus</i> (Blackwall, 1834)			2004
<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	Drassode lapidicole		2010
<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)			2004
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)			2006
<i>Drassyllus praeficus</i> (L. Koch, 1866)			2010
<i>Drepanotylus uncatatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)		EN	1994
<i>Dysdera crocata</i> C.L. Koch, 1838			2004
<i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer, 1802)	Dysdère érythrine		2010
<i>Dysdera fuscipes</i> Simon, 1882		EN	2010
<i>Enoplognatha mordax</i> (Thorell, 1875)			2006
<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1758)	Théridion ovoïde		2013
<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)			2002
<i>Episinus maculipes</i> Cavanna, 1876			2010
<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	Épisine tronqué		2006
<i>Eratigena agrestis</i> (Walckenaer, 1802)			2011
<i>Eratigena picta</i> (Simon, 1870)			2010
<i>Eratigena saeva</i> (Blackwall, 1844)			1996

<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	Érigone noire		2010
<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)			2006
<i>Erigone promiscua</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)			2006
<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	Araignée cannibale		2006
<i>Ero cambridgei</i> Kulczynski, 1911			2006
<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)			2010
<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)			2010
<i>Euophrys herbigrada</i> (Simon, 1871)			2006
<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)			2012
<i>Gonatium rubens</i> (Blackwall, 1833)			1994
<i>Gongylidiellum vivum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)			2010
<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)			2006
<i>Hahnia helveola</i> Simon, 1875			2010
<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)			2010
<i>Haplodrassus dalmatensis</i> (L. Koch, 1866)			2006
<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)			2010
<i>Harpactea hombergi</i> (Scopoli, 1763)	Harpactée pattes-rayées		2009
<i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)	Saltique cuivré		2013
<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832)			2010
<i>Heliophanus tribulosus</i> Simon, 1869			1995
<i>Homalenotus quadridentatus</i> (Cuvier, 1795)			2002
<i>Hybocoptus corrugis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)			2010
<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)			2010
<i>Hypomma fulvum</i> (Bösenberg, 1902)			2006
<i>Hypsosinga albovittata</i> (Westring, 1851)			2006
<i>Hypsosinga heri</i> (Hahn, 1831)			2011
<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)	Épeire des roseaux		2015
<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)			2006
<i>Lepthyphantes ericaeus</i> Braendegaard, 1928			2002
<i>Lepthyphantes pallidus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			2002
<i>Lepthyphantes tenuis</i> Bosmans, 1985			2002
<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758)	Linyphie triangulaire		2010
<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	Mangore petite-bouteille		2012
<i>Marpissa nivoyi</i> (Lucas, 1846)			2006
<i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)			2010
<i>Mecopisthes peusi</i> Wunderlich, 1972			1994
<i>Metellina mengei</i> (Blackwall, 1869)			2010
<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)			1996
<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1758)	Méta d'automne		2011
<i>Micaria albovittata</i> (Lucas, 1846)			2006
<i>Micaria fulgens</i> (Walckenaer, 1802)			2004
<i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831)			2010
<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)			2010
<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)			2010
<i>Minicia marginella</i> (Wider, 1834)			2006

<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1758)	Misumène variable		2014
<i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)	Saltique fourmi		2010
<i>Nemastoma bimaculatum</i> (Fabricius, 1775)			2002
<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	Épeires fougères		2010
<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	Théridion à deux tâches		2006
<i>Neottiura suaveolens</i> (Simon, 1880)			1996
<i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1830)			2010
<i>Nesticus cellulanus</i> (Clerck, 1758)	Nestique alvéolé		1995
<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	Épeire des fissures		2013
<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)			2006
<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)			2010
<i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)			2010
<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)			2006
<i>Ostearius melanopygius</i> (O. Pickard-Cambridge, 1880)	Érigone cul-noir		2004
<i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1800)	Ozyptile sablée		2010
<i>Ozyptila praticola</i> (C.L. Koch, 1837)			2010
<i>Ozyptila sanctuaria</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			2010
<i>Ozyptila simplex</i> (O. Pickard-Cambridge, 1862)			2010
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823			2001
<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1830			2010
<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)			2006
<i>Palliduphantes pallidus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			2010
<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)			2004
<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1758)			2004
<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)			2010
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)			2010
<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1847)			2010
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)			2010
<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)			2010
<i>Pellenes nigrociliatus</i> (Simon, 1875)			1996
<i>Phalangium opilio</i> Linnaeus, 1758			2004
<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1758)			2010
<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)			2012
<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826	Philodrome disparate		2015
<i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826			2006
<i>Phlegra bresnieri</i> (Lucas, 1846)			2004
<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)			2010
<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)			1995
<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	Phrurolithus drôle		2010
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)	Pirate commune		2013
<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1758)			2006
<i>Piratula latitans</i> (Blackwall, 1841)			2010
<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)	Pisaure admirable		2014
<i>Platnickina tinctoria</i> (Walckenaer, 1802)			2010
<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953			2002

<i>Poecilochroa variana</i> (C.L. Koch, 1839)			2010
<i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834)			2006
<i>Psammitis sabulosus</i> (Hahn, 1832)			2004
<i>Pulchellodromus pulchellus</i> (Lucas, 1846)			2006
<i>Robertus arundineti</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			1994
<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)			2000
<i>Rugathodes instabilis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			2006
<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1758)	Saltique arlequin		2014
<i>Savignia frontata</i> Blackwall, 1833			2006
<i>Scotophaeus blackwalli</i> (Thorell, 1871)			2004
<i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)			1995
<i>Silometopus ambiguus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1906)		NT	2002
<i>Silometopus elegans</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)			2010
<i>Stemonyphantes lineatus</i> (Linnaeus, 1758)			2009
<i>Talavera aequipes</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			2006
<i>Tallusia experta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)			1995
<i>Taranucnus setosus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1863)			2010
<i>Tegenaria picta</i> Simon, 1870			2002
<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)			2010
<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)			2010
<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)			2010
<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	Tétragnathe étirée		2012
<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874			2010
<i>Tetragnatha nigrita</i> Lendl, 1886			2006
<i>Thanatus striatus</i> C.L. Koch, 1845			2004
<i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870			2006
<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833			2006
<i>Theridiosoma gemmosum</i> (L. Koch, 1877)	Théridiosome précieuse		2006
<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	Philodrome oblong		2004
<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)			2010
<i>Trachyzelotes pedestris</i> (C.L. Koch, 1837)			2010
<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)			2010
<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	Trochose terrassière		2014
<i>Walckenaera antica</i> (Wider, 1834)			1905
<i>Walckenaera monoceros</i> (Wider, 1834)			2002
<i>Walckenaeria acuminata</i> Blackwall, 1833	Érigone périscope		1995
<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1878)			2002
<i>Walckenaeria unicornis</i> O. Pickard-Cambridge, 1861			2001
<i>Walckenaeria vigilax</i> (Blackwall, 1853)			2010
<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L. Koch, 1834)			2010
<i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)			2015
<i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872			2010
<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)			2006
<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1758)	Xystique crêté		2010
<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)			2010

<i>Xysticus kempeleni</i> Thorell, 1872		2010
<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872		2010
<i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839)		2004
<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	Zélate noir de Latreille	2010
<i>Zelotes longipes</i> (L. Koch, 1866)		2010
<i>Zelotes lutetianus</i> (L. Koch, 1866)		2002
<i>Zelotes pusillus</i> (L. Koch, 1833)		2002
<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer, 1802)	Diodie tête de mort	2010
<i>Zodarion italicum</i> (Canestrini, 1868)	Zodarion italien	2010
<i>Zora armillata</i> Simon, 1878		2002
<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	Zora	2010
<i>Zygiella x-notata</i> (Clerck, 1758)	Épeire des fenêtres	2010

LR Fr : liste rouge française des araignées de France métropolitaine (2023)

Obs. : dernière observation de l'espèce sur le site

Annexe 11 – Liste des hétérocères aquatiques recensés sur le site

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Obs.
<i>Corixa panzeri</i> Fieber, 1848		2022
<i>Corixa punctata</i> (Illiger, 1807)	Batelier	2022
<i>Cymatia coleoptrata</i> (Fabricius, 1777)		2022
<i>Hesperocorixa linnaei</i> (Fieber, 1848)		2022
<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)		2022
<i>Sigara dorsalis</i> (Leach, 1817)		2022
<i>Sigara falleni</i> (Fieber, 1848)		2022
<i>Sigara lateralis</i> (Leach, 1817)		2022
<i>Sigara semistriata</i> (Fieber, 1848)		2022
<i>Sigara stagnalis stagnalis</i> (Leach, 1817)		2022
<i>Aquarius najas</i> (De Geer, 1773)		2022
<i>Gerris argentatus</i> Schummel, 1832		2022
<i>Gerris asper</i> (Fieber, 1860)		2022
<i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	Araignée d'eau	2022
<i>Gerris odontogaster</i> (Zetterstedt, 1828)		2022
<i>Gerris thoracicus</i> Schummel, 1832		2022
<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)	Hydromètre stagnant	2022
<i>Ilyocoris cimicoides cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Naucoris maculatus maculatus</i> Fabricius, 1798	Naucore	2022
<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758	Nèpe cendrée	2022
<i>Notonecta glauca glauca</i> Linnaeus, 1758	Notonecte glauque	2022
<i>Notonecta meridionalis</i> Poisson, 1932		2022
<i>Notonecta viridis</i> Delcourt, 1909		2022
<i>Plea minutissima minutissima</i> Leach, 1817		2022
<i>Microvelia pygmaea</i> (Dufour, 1833)	Microvélie pygmée	2022
<i>Microvelia reticulata</i> (Burmeister, 1835)		2022
<i>Velia caprai caprai</i> Tamanini, 1947		2022

Obs. : dernière observation de l'espèce sur le site

Annexe 12 – Liste des coléoptères recensés sur le site

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Obs.
<i>Abax ater</i> (Villers, 1789)		2002
<i>Ablattaria laevigata</i> (Fabricius, 1775)	Silphe des friches	2019
<i>Acritus homoeopathicus</i> Wollaston, 1857		2002
<i>Acupalpus meridianus</i> (Linnaeus, 1760)		2016
<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à dix points	2019
<i>Agabus labiatus</i> (Brahm, 1790)		2009
<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (De Geer, 1775)		2020
<i>Agonum duftschmidi</i> Schmidt, 1994		2022
<i>Agonum marginatum</i> (Linnaeus, 1758)		2016
<i>Agonum muelleri</i> (Herbst, 1784)		2014
<i>Agonum thoreyi</i> Dejean, 1828		2015
<i>Agonum viduum</i> (Panzer, 1797)		2008
<i>Agrilus cyanescens</i> (Ratzeburg, 1837)		2008
<i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus, 1767)	Taupin des moissons	2015
<i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin rongeur	2022
<i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer, 1797)		2018
<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)	Amare bronzée	2017
<i>Amara convexior</i> Stephens, 1828		2015
<i>Amara fulva</i> (O.F. Müller, 1776)		2013
<i>Amara kulti</i> Fassati, 1947		2016
<i>Amara strenua</i> Zimmermann, 1832		2015
<i>Amphimallon solstitiale</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton de la Saint-Jean	2017
<i>Anaspis maculata</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785	Anaspe fauve	2022
<i>Anaspis rufilabris</i> (Gyllenhal, 1827)		2019
<i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)		2005
<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)		2014
<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à dix-neuf points	2019
<i>Anoxia villosa</i> (Fabricius, 1782)		2019
<i>Anthocomus rufus</i> (Herbst, 1784)		2017
<i>Aphodius foetidus</i> (Herbst, 1783)		2018
<i>Aphthona lutescens</i> (Gyllenhal, 1813)		2016
<i>Aphthona nonstriata</i> Goeze, 1777	Altise bleue sans stries	2016
<i>Aphthona semicyanea</i> Allard, 1859		2017
<i>Archarius pyrrhoceras</i> (Marsham, 1802)		2010
<i>Astilbus canaliculatus</i> (Fabricius, 1787)		2002
<i>Aulacobaris lepidii</i> (Germar, 1823)		2010
<i>Badister bullatus</i> (Schrank, 1798)		2014
<i>Bembidion lunulatum</i> (Fourcroy, 1785)		2013
<i>Blethisa multipunctata multipunctata</i> (Linnaeus, 1758)		2006
<i>Brachypterus glaber</i> (Newman, 1834)		2022
<i>Brassicogethes viridescens</i> (Fabricius, 1787)		2022
<i>Bruchidius ater</i> (Marsham, 1802)		2016
<i>Bruchidius bimaculatus</i> (Olivier, 1800)		2022

<i>Bruchidius villosus</i> (Fabricius, 1792)		2016
<i>Bruchus luteicornis</i> Illiger, 1794		2022
<i>Calathus erratus erratus</i> (C.R. Sahlberg, 1827)		2008
<i>Calathus fuscipes fuscipes</i> (Goeze, 1777)	Bupreste noir à pattes brunes	2009
<i>Calathus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)		2014
<i>Calathus mollis</i> (Marsham, 1802)		2014
<i>Carabus cancellatus</i> Illiger, 1798	Carabe tressé	1991
<i>Carabus granulatus</i> Linnaeus, 1758		2018
<i>Cassida rubiginosa</i> O.F. Müller, 1776		2017
<i>Cassida sanguinolenta</i> O.F. Müller, 1776		2022
<i>Cercyon sternalis</i> (Sharp, 1918)		2022
<i>Ceutorhynchus obstrictus</i> (Marsham, 1802)		2022
<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsham, 1802)		2022
<i>Charagmus griseus</i> (Fabricius, 1775)		2016
<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle des landes	2020
<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1791)		2019
<i>Chrysolina americana</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysomèle du Romarin	2015
<i>Chrysolina haemoptera</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysomèle violette	2017
<i>Chrysolina lucida</i> (Olivier, 1807)		2010
<i>Chrysomela populi</i> Linnaeus, 1758	Chrysomèle populaire	2019
<i>Cicindela hybrida</i> Linnaeus, 1758	Cicindèle hybride	2016
<i>Cleonis pigra</i> (Scopoli, 1763)	Grand-charançon du Chardon	2006
<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758)	Clyte d'Eastwood	2017
<i>Coccidula rufa</i> (Herbst, 1783)		2020
<i>Coccidula scutellata</i> (Herbst, 1783)		2019
<i>Coccinella sedecimpunctata</i> Linnaeus, 1760		2017
<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à 7 points	2020
<i>Coccinella undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758		2019
<i>Colymbetes fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	Dytique noir	2009
<i>Coniatus tamarisci</i> (Fabricius, 1787)	Charançon du Tamaris	2017
<i>Contacyphon padi</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802)		2015
<i>Crepidodera fulvicornis</i> (Fabricius, 1792)		2011
<i>Crioceris asparagi</i> (Linnaeus, 1758)	Criocère de l'asperge	2019
<i>Crioceris duodecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Criocère à 12 points	2019
<i>Crypticus quisquilius</i> (Linnaeus, 1760)		2018
<i>Cryptocephalus aureolus</i> Suffrian, 1847		2015
<i>Cryptocephalus hypochaeridis</i> (Linnaeus, 1758)		2015
<i>Cryptocephalus vittatus</i> Fabricius, 1775		2018
<i>Cryptophonus melancholicus</i> (Dejean, 1829)		2008
<i>Cteniopos sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)		2011
<i>Cybister lateralimarginalis</i> (De Geer, 1774)	Cybister à côtés bordés	2018
<i>Dermestes sardous</i> Küster, 1846		2016
<i>Donacia clavipes</i> Fabricius, 1792		2020
<i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1758)	Petite biche	2019

<i>Dorytomus melanophthalmus</i> (Paykull, 1792)		2009
<i>Dyschiriodes aeneus aeneus</i> (Dejean, 1825)		2009
<i>Dyschiriodes globosus</i> (Herbst, 1784)		2014
<i>Dyschirius thoracicus</i> (Rossi, 1790)		2009
<i>Dytiscus marginalis</i> Linnaeus, 1758	Dytique bordé	2020
<i>Elaphrus cupreus</i> Duftschmid, 1812		2006
<i>Enochrus bicolor</i> (Fabricius, 1792)		2015
<i>Enochrus melanocephalus</i> (Olivier, 1793)		2014
<i>Epitrix pubescens</i> (Koch, 1803)		2022
<i>Exaesiopus grossipes</i> (Marseul, 1855)		2004
<i>Exapion fuscirostre</i> (Fabricius, 1775)		2022
<i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)		2020
<i>Galeruca tanacetii</i> (Linnaeus, 1758)	Galéruque de la tanaïsie	2017
<i>Galerucella californiensis</i> (Linnaeus, 1767)	Chrysomèle de la Salicaire	2022
<i>Galerucella tenella</i> (Linnaeus, 1760)		2016
<i>Gastrophysa polygoni</i> (Linnaeus, 1758)	Gastrophyse de la Renouée	2020
<i>Geotrupes puncticollis</i> Malinowsky, 1811		2011
<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	Lepturette rousse	2010
<i>Graptus triguttatus</i> (Fabricius, 1775)		2006
<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)		2017
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Coccinelle asiatique	2017
<i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763)	Coccinelle à quatre points	2019
<i>Harpalus affinis</i> (Schranck, 1781)	Harpale affine	2006
<i>Harpalus anxius</i> (Duftschmid, 1812)		2009
<i>Harpalus attenuatus</i> Stephens, 1828		2007
<i>Harpalus dimidiatus</i> (Rossi, 1790)		2006
<i>Harpalus neglectus</i> Audinet-Serville, 1821		2014
<i>Harpalus pumilus</i> Sturm, 1818		2014
<i>Harpalus rubripes</i> (Duftschmid, 1812)		2009
<i>Harpalus rufipalpis</i> Sturm, 1818		2014
<i>Harpalus serripes</i> (Quensel in Schönherr, 1806)	Harpale serripède	2014
<i>Harpalus tardus</i> (Panzer, 1797)		2013
<i>Henosepilachna argus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Coccinelle de la Bryone	2020
<i>Heterocerus fenestratus</i> (Thunberg, 1784)		2019
<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777)	Coccinelle des friches	2019
<i>Hirticomus hispidus</i> (Rossi, 1792)		2013
<i>Hispa atra</i> Linnaeus, 1767		2020
<i>Hister quadrimaculatus</i> Linnaeus, 1758	Hister à quatre tâches	2017
<i>Holotrichapion pisi</i> (Fabricius, 1801)		2013
<i>Hoplia philanthus</i> (Fuessly, 1775)		2015
<i>Hydaticus seminiger</i> (De Geer, 1774)		2005
<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)	Hydrophile noir strié	2014
<i>Hydrophilus piceus</i> (Linnaeus, 1758)	Hydrophile	2014
<i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1760)	Hydropore des marais	2010
<i>Hydroporus planus</i> (Fabricius, 1781)		2008

<i>Hypera nigrirostris</i> (Fabricius, 1775)		2010
<i>Hypera postica</i> (Gyllenhal, 1813)		2022
<i>Hyphydrus aubei</i> Ganglbauer, 1891		2010
<i>Hypocaccus metallicus</i> (Herbst, 1791)		2014
<i>Hypocaccus rugifrons</i> (Paykull, 1798)		2017
<i>Ilybius ater</i> (De Geer, 1774)		2005
<i>Ischnopterapion loti</i> (Kirby, 1808)		2013
<i>Isomira murina</i> (Linnaeus, 1758)		2015
<i>Laccobius bipunctatus</i> (Fabricius, 1775)		2015
<i>Lixus angustus</i> (Herbst, 1795)		2016
<i>Longitarsus pratensis</i> (Panzer, 1794)		2022
<i>Loricera pilicornis pilicornis</i> (Fabricius, 1775)		2005
<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf-volant	2009
<i>Mecinus pascuorum</i> (Gyllenhal, 1813)		2022
<i>Mecinus pyraeter</i> (Herbst, 1795)		2022
<i>Megodontus purpurascens</i> (Fabricius, 1787)	Carabe purpurin	2002
<i>Melanimon tibiale</i> (Fabricius, 1781)		2016
<i>Melanotus punctolineatus</i> (Pélerin, 1829)	Mélanothus noir	2014
<i>Microlestes minutulus</i> (Goeze, 1777)		2014
<i>Microplontus rugulosus</i> (Herbst, 1795)		2011
<i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst, 1784)	Charançon des iris	2022
<i>Myzia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758)		2012
<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	Nébrie à cou bref	2006
<i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Silphe des rivages	2018
<i>Necrophorus fossor</i> Erichson, 1837		2002
<i>Necrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758)	Nécrophore imité	2002
<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Neocrepidodera transversa</i> (Marsham, 1802)		2016
<i>Nimbus contaminatus</i> (Herbst, 1783)		2011
<i>Noterus clavicornis</i> (De Geer, 1774)		2009
<i>Notiophilus biguttatus</i> (Fabricius, 1779)		2016
<i>Notiophilus substriatus</i> G.R. Waterhouse, 1833		2015
<i>Notoxus monoceros</i> (Linnaeus, 1760)		2022
<i>Ochthephilum fracticorne</i> (Paykull, 1800)		2013
<i>Ocypus brunnipes</i> (Fabricius, 1781)		2005
<i>Ocypus fuscatus</i> (Gravenhorst, 1802)		2006
<i>Ocypus olens</i> (O.F. Müller, 1764)	Staphylin odorant	2006
<i>Ocypus ophthalmicus</i> (Scopoli, 1763)		2005
<i>Odacantha melanura</i> (Linnaeus, 1767)		2013
<i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763)	Cycliste maillot-vert	2017
<i>Olibrus aeneus</i> (Fabricius, 1792)		2022
<i>Olibrus liquidus</i> Erichson, 1845		2022
<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)	Onthophage vacca	2017
<i>Ophonus diffinis</i> (Dejean, 1829)		2006
<i>Ophonus puncticollis</i> (Paykull, 1798)		2015

<i>Otiorhynchus ligneus</i> (Olivier, 1807)		2007
<i>Otiorhynchus morio</i> (Fabricius, 1781)		2014
<i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linnaeus, 1758)		2007
<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758)	Criocère des céréales	2014
<i>Oxystoma pomonae</i> (Fabricius, 1798)		2013
<i>Oxytelus piceus</i> (Linnaeus, 1767)		2015
<i>Paederus caligatus</i> Erichson, 1840		2015
<i>Paederus littoralis</i> Gravenhorst, 1802		2009
<i>Paradromius linearis</i> (Olivier, 1795)		2015
<i>Paradromius longiceps</i> (Dejean, 1826)		2022
<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)		2016
<i>Parexochomus nigromaculatus</i> (Goeze, 1777)		2020
<i>Philochthus aeneus</i> (Germar, 1823)		2016
<i>Philochthus biguttatus</i> (Fabricius, 1779)		2006
<i>Philochthus guttula</i> (Fabricius, 1792)		2015
<i>Philochthus lunulatus</i> (Geffroy in Fourcroy, 1785)	Bupreste à lunules	2009
<i>Philonthus cognatus</i> Stephens, 1832		2015
<i>Philonthus nitidicollis</i> (Lacordaire, 1835)		2009
<i>Philonthus varians</i> (Paykull, 1789)		2014
<i>Philopeton plagiatum</i> (Schaller, 1783)		2016
<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)		2014
<i>Phratora laticollis</i> (Suffrian, 1851)		2014
<i>Phratora vitellinae</i> (Linnaeus, 1758)		2015
<i>Phratora vulgatissima</i> (Linnaeus, 1758)		2009
<i>Phylan gibbus auct. non</i> (Fabricius, 1775)		2016
<i>Phyllobius argentatus</i> (Linnaeus, 1758)		2017
<i>Phyllobius oblongus</i> (Linnaeus, 1758)	Charançons à étuis fauves	2015
<i>Phyllobius pyri</i> (Linnaeus, 1758)		2022
<i>Phyllotreta consobrina</i> (Curtis, 1837)		2022
<i>Phyllotreta undulata</i> Kutschera, 1860		2022
<i>Platydacus fulvipes</i> (Scopoli, 1763)		2005
<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)		2002
<i>Pogonus chalceus</i> (Marsham, 1802)		2016
<i>Polydrusus marginatus</i> Stephens, 1831		2022
<i>Polydrusus planifrons</i> Gyllenhal, 1834		2022
<i>Polydrusus prasinus</i> Olivier, 1790		2015
<i>Princidium pallidipenne</i> (Illiger, 1802)		2009
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à damier	2018
<i>Protapion trifolii</i> (Linnaeus, 1768)		2016
<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)		2005
<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777)	Lepture havane	2010
<i>Psilothrix viridicoerulea</i> (Geoffroy, 1785)	Dasyte émeraude	2016
<i>Psylliodes affinis</i> (Paykull, 1799)	Altise de la pomme de terre	2022
<i>Psylliodes chrysocephalus</i> (Linnaeus, 1758)		2016
<i>Psylliodes marcida</i> (Illiger, 1807)		2016

<i>Pterostichus gracilis</i> (Dejean, 1828)		2013
<i>Pterostichus minor</i> (Gyllenhal, 1827)		2005
<i>Pterostichus niger</i> (Schaller, 1783)	Féronie commune	2005
<i>Pterostichus nigrita</i> (Paykull, 1790)		2009
<i>Pterostichus strenuus</i> (Panzer, 1797)		2005
<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)		2008
<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)	Cardinal imposteur	2010
<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)		2006
<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	Téléphore fauve	2002
<i>Rhantus frontalis</i> (Marsham, 1802)		2010
<i>Rhinoncus pericarpus</i> (Linnaeus, 1758)		2016
<i>Rhizotrogus marginipes</i> Mulsant, 1842		2015
<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792)		2019
<i>Rhyzobius litura</i> (Fabricius, 1787)		2020
<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Rosalie des Alpes	2009
<i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761)	Lepture tachetée	2011
<i>Sagittogethes umbrosus</i> (Sturm, 1845)		2022
<i>Saprinus aeneus</i> (Fabricius, 1775)		2016
<i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777)	Coccinelle velue à bandes	2019
<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)		2018
<i>Sermylassa halensis</i> (Linnaeus, 1767)	Galérucelle du Gaillet	2019
<i>Silpha atrata</i> Linnaeus, 1758		2002
<i>Silpha granulata</i> Thunberg, 1794	Silphe triste	2002
<i>Sitona cambricus</i> Stephens, 1831		2010
<i>Sitona griseus</i> (Fabricius, 1775)		2017
<i>Sitona lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	Sitone du pois	2017
<i>Sitona puncticollis</i> Stephens, 1831		2009
<i>Sitona regensteinensis</i> (Herbst, 1794)		2011
<i>Staphylinus caesareus</i> Cederhjelm, 1798		2009
<i>Staphylinus dimidiaticornis</i> Gemminger, 1851		2015
<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784)		2016
<i>Stenus juno</i> (Paykull, 1789)		2013
<i>Stenus ossium</i> Stephens, 1833		2022
<i>Steropus madidus</i> Fabricius, 1775		2002
<i>Stictoleptura fulva</i> (De Geer, 1775)	Lepture sauvage	2010
<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture cardinale	2010
<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (Linnaeus, 1758)		2017
<i>Syntomus foveatus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Bupreste strié à quatre points enfoncés	2017
<i>Tachinus marginellus</i> (Fabricius, 1781)		2013
<i>Tasgius globulifer globulifer</i> (Geoffroy, 1785)	Petit staphylin noir	2005
<i>Tasgius morsitans</i> (Rossi, 1790)		2005
<i>Tasgius pedator</i> (Gravenhorst, 1802)		2005
<i>Thanatophilus sinuatus</i> Fabricius	Thanatophile sinueux	2009
<i>Timarcha goettingensis</i> (Linnaeus, 1758)		2019

<i>Timarcha maritima</i> Perris, 1855		2019
<i>Trepanes articulatus</i> (Panzer, 1796)		2013
<i>Trepanes assimilis</i> (Gyllenhal, 1810)		2008
<i>Trichosirocalus troglodytes</i> (Fabricius, 1787)		2022
<i>Tychius schneideri</i> (Herbst, 1795)		2016
<i>Typhaeus typhoeus</i> (Linnaeus, 1758)	Minotaure	2006
<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1760)		2020
<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	Cétoine punaise	2017
<i>Xantholinus linearis</i> (Olivier, 1795)		2009
<i>Xantholinus longiventris</i> Heer, 1839		2010
<i>Zabrus tenebrioides</i> (Goeze, 1777)	Bupreste paresseux	2015

Obs. : dernière observation de l'espèce sur le site

Annexe 13 – Liste des autres invertébrés continentaux recensés sur le site

Phylum	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Obs.
Blattes, Mantres (Dictyoptera)	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	Mante religieuse	2018
Isopodes (Isopoda)	<i>Armadillidium album</i> Dollfus, 1887		2004
	<i>Ligia oceanica</i> (Linnaeus, 1767)	Ligie océanique	2016
	<i>Philoscia muscorum</i> (Scopoli, 1763)	Philoscie des mousses	2015
	<i>Porcellio scaber</i> Latreille, 1804		2015
Diptères (Diptera)	<i>Anasimyia lineata</i> (Fabricius, 1787)		2017
	<i>Anasimyia transfuga</i> (Linnaeus, 1758)		1989
	<i>Cheilosia albitarsis</i> (Meigen, 1822)		2017
	<i>Cheilosia pagana</i> (Meigen, 1822)		1989
	<i>Chrysotoxum bicinctum</i> (Linnaeus, 1758)		1989
	<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)		2018
	<i>Eristalinus sepulchralis</i> (Linnaeus, 1758)		2018
	<i>Eristalis horticola</i> (De Geer, 1776)		1989
	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	Eristale gluante	2017
	<i>Eumerus sogdianus</i> Stackelberg, 1952		1989
	<i>Eumerus strigatus</i> (Fallén, 1817)		1989
	<i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1794)		1989
	<i>Eupeodes latifasciatus</i> (Macquart, 1829)		1989
	<i>Helophilus pendulus</i> (Linnaeus, 1758)		2016
	<i>Melanostoma scalare</i> (Fabricius, 1794)		2016
	<i>Meliscaeva auricollis</i> (Meigen, 1822)		1989
	<i>Merodon equestris</i> (Fabricius, 1794)	Mouche des narcisses	1989
	<i>Neoascia interrupta</i> (Meigen, 1822)		1989
<i>Neoascia obliqua</i> Coe, 1940		1989	

	<i>Neoascia tenur</i> (Harris, 1780)		2017
	<i>Orthonevra splendens</i> (Meigen, 1822)		1989
	<i>Parhelophilus frutetorum</i> (Fabricius, 1775)		1989
	<i>Platycheirus albimanus</i> (Fabricius, 1781)		1989
	<i>Platycheirus angustatus</i> (Zetterstedt, 1843)		1989
	<i>Platycheirus clypeatus</i> (Meigen, 1822)		1989
	<i>Platycheirus manicatus</i> (Meigen, 1822)		1989
	<i>Platycheirus scutatus</i> (Meigen, 1822)		1989
	<i>Pyrophæna granditarsa</i> (Forster, 1771)		1989
	<i>Rhingia campestris</i> Meigen, 1822	Rhyngie champêtre	2016
	<i>Scaeva pyrastris</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphe du poirier	2018
	<i>Sphaerophoria loewi</i> Zetterstedt, 1843		1989
	<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)		2018
	<i>Stratiomys longicornis</i> (Scopoli, 1763)		2017
	<i>Stratiomys singularior</i> (Harris, 1778)		2017
	<i>Syrirta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)		1989
	<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphe du groseillier	1989
	<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822		1989
	<i>Tachina grossa</i> (Linnaeus, 1758)		2017
	<i>Tropidia scita</i> (Harris, 1780)		1989
	<i>Volucella bombylans</i> (Linnaeus, 1758)		1989
	<i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)		1989
Forficules (Dermaptera)	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758	Forficule	2015
	<i>Forficula lesnei</i> Finot, 1887		2012
Hémiptères (Hemiptera)	<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise à tête allongée	2020
	<i>Aepophilus bonnairei</i> Signoret, 1879	Punaise des estrans	2019
	<i>Alydus calcaratus</i> (Linnaeus, 1758)		2019
	<i>Aphanus rolandri</i> (Linnaeus, 1758)	Aphanus de Rolander	2019
	<i>Bactericera silvarnis</i> (Hodkinson, 1974)		1999
	<i>Byrsinus flavicornis</i> (Fabricius, 1794)		2019
	<i>Cacopsylla saliceti</i> (Foerster, 1848)		1999
	<i>Canthophorus impressus</i> (Horváth, 1881)		2016
	<i>Canthophorus melanopterus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)		2020
	<i>Carpocoris mediterraneus atlanticus</i> Tamanini, 1958		2020
	<i>Centrotus cornutus</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-diable	2017
	<i>Cercopis vulnerata</i> Rossi, 1807	Cercepe	2017
	<i>Chartoscirta cincta</i> (Herrich-Schäffer, 1841)		2014
	<i>Chorosoma schillingii</i> (Schilling, 1829)		2014
	<i>Coranus griseus</i> (Rossi, 1790)		2016
	<i>Coranus kerzhneri</i> P.V. Putshkov, 1982		2016
	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	Corée marginée	2019
	<i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)	Corise de la jusquiame	2019
	<i>Cymus glandicolor</i> Hahn, 1832		2020

	<i>Dicranocephalus agilis</i> (Scopoli, 1763)		2017
	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise brune à antennes & bords panachés	2020
	<i>Dyroderes umbraculatus</i> (Fabricius, 1775)		2017
	<i>Enoplops scapha</i> (Fabricius, 1794)		2012
	<i>Eurydema herbacea</i> (Herrich-Schäffer, 1833)		2020
	<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise verte à raies & rouges ou blanches	2019
	<i>Eurydema ornata</i> (Linnaeus, 1758)		2012
	<i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)		2014
	<i>Eurygaster testudinaria</i> (Geoffroy, 1785)	Punaise tortue brune	2017
	<i>Eysarcoris ventralis</i> (Westwood, 1837)		2016
	<i>Geotomus punctulatus</i> (A. Costa, 1847)		2020
	<i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766)	Punaise arlequin	2020
	<i>Lasiacantha capucina</i> (Germar, 1837)		2014
	<i>Legnotus limbosus</i> (Geoffroy, 1785)	Punaise noire à bordure blanche	2017
	<i>Legnotus picipes</i> (Fallén, 1807)		2016
	<i>Livia junci</i> (Schrank, 1789)		1999
	<i>Lygaeosoma sardeum</i> Spinola, 1837		2020
	<i>Megalonotus praetextatus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)		2020
	<i>Melanocoryphus albomaculatus</i> (Goeze, 1778)		2019
	<i>Micrellytra fossularum</i> (Rossi, 1790)		2017
	<i>Neottiglossa leporina</i> (Herrich-Schäffer, 1830)		2020
	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise verte ponctuée	2018
	<i>Odontoscelis lineola</i> Rambur, 1839		2016
	<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1760)	Punaise verte	2019
	<i>Peritrechus gracilicornis</i> Puton, 1877		2020
	<i>Peritrechus lundii</i> (Gmelin, 1790)		2020
	<i>Physatocheila dumetorum</i> (Herrich-Schäffer, 1838)		2014
	<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)		2017
	<i>Podops inunctus</i> (Fabricius, 1775)		2016
	<i>Prostemma guttula</i> (Fabricius, 1787)		2012
	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	Gendarme	2020
	<i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda, 1761)	Punaise nébuleuse	2019
	<i>Scolopostethus puberulus</i> Horváth, 1887		2020
	<i>Sehirus morio</i> (Linnaeus, 1760)		2019
	<i>Syromastus rhombeus</i> (Linnaeus, 1767)		2011
	<i>Trapezonotus ullrichi</i> (Fieber, 1837)		2020
	<i>Xanthochilus quadratus</i> (Fabricius, 1798)		2020
	<i>Zicrona caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise verte bleuâtre	2019
Hyménoptères (Hymenoptera)	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	Bourdon des pierres	2017
	<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	Bourdon des champs	2016
	<i>Lasius flavus</i> (Fabricius, 1782)	Fourmi jaune	2002
	<i>Lasius fuliginosus</i> (Latreille, 1798)		2002

	<i>Myrmica sabuleti</i> Meinert, 1861		2002
	<i>Philanthus triangulum</i> (Fabricius, 1775)		2020
	<i>Podalonia hirsuta</i> (Scopoli, 1763)		2010
	<i>Polyergus rufescens</i> (Latreille, 1798)		2020
	<i>Rhogogaster viridis</i> (Linnaeus, 1758)		2016
	<i>Sphex rufocinctus</i> Brullé, 1883		2010
	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	Frelon d'Europe	2020
	<i>Vespa germanica</i> (Fabricius, 1793)	Guêpe germanique	2020
Mollusques (Mollusca)	<i>Acroloxus lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	Patelline d'Europe	1952
	<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)	Planorbe des fossés	1962
	<i>Anisus spirorbis</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbe de Linné	1962
	<i>Aplexa hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)	Physe élancée	1962
	<i>Bathyomphalus contortus</i> (Linnaeus, 1758)		
	<i>Lymnaea glabra</i> (O.F. Müller, 1774)		1952
	<i>Lymnaea palustris</i> (O.F. Müller, 1774)	Limnée des étangs	1962
	<i>Lymnaea peregra</i> (O.F. Müller, 1774)		1962
	<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	Grande limnée	1962
	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	Physe voyageuse	1952
	<i>Physa fontinalis</i> (Linnaeus, 1758)	Physe bulle	1952
	<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbe commune	1962
	<i>Arion intermedius</i> Normand, 1852	Loche hérisson	2015
	<i>Arion rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Grande loche	2015
	<i>Ashfordia granulata</i> (Alder, 1830)	Veloutée moine	1992
	<i>Cepaea hortensis</i> (O.F. Müller, 1774)	Escargot des jardins	2013
	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot des haies	2015
	<i>Ceruella virgata</i> (da Costa, 1778)	Caragouille globuleuse	1992
	<i>Clausilia bidentata</i> (Strøm, 1765)	Clausilie commune	2014
	<i>Cochlicella acuta</i> (O.F. Müller, 1774)	Cornet étroit	2016
	<i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774)	Escargot petit-gris	2016
	<i>Deroceras caruanae</i> (Pollonera, 1891)		1994
	<i>Deroceras laeve</i> (O.F. Müller, 1774)	Loche des marais	1994
	<i>Deroceras reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774)	Loche laiteuse	1994
	<i>Euconulus alderi</i> (J.E. Gray, 1840)		1994
	<i>Helicella itala</i> (Linnaeus, 1758)	Hélicelle trompette	1992
	<i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778)	Maillot commun	2015
	<i>Milax gagates</i> (Draparnaud, 1801)	Pseudolimace jayet	1983
	<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)	Ambrette élégante	2013
	<i>Potamopyrgus jenkinsi</i> (E. A. Smith, 1889)	Hydrobie des antipodes	1962
	<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)	Ambrette amphibie	1994
	<i>Theba pisana</i> (O.F. Müller, 1774)	Caragouille rosée	2016
	<i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774)	Vallonie costulée	1992
	<i>Valvata cristata</i> O.F. Müller, 1774	Valvée plane	1962
	<i>Valvata minuta</i> Draparnaud, 1805	Petite globhydrobie	1952
	<i>Vertigo antivertigo</i> (Draparnaud, 1801)	Vertigo des marais	1994
	<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)	Vertigo commun	1994

	<i>Vitrea crystallina</i> (O.F. Müller, 1774)	Cristalline commune	1994
	<i>Xeroplexa intersecta</i> (Poiret, 1801)	Hélicette carénée	1992
	<i>Zonitoides nitidus</i> (O.F. Müller, 1774)	Luisantine des marais	1994
Myriapodes (Lithobiomorpha)	<i>Lithobius forficatus</i> (Linnaeus, 1758)		2002
Phasmes (Phasmoptera)	<i>Clonopsis gallica</i> (Charpentier, 1825)	Phasme gaulois	2018

Obs. : dernière observation de l'espèce sur le site

Annexe 14 – Liste des invertébrés marins recensés sur le site

Pylum	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Obs.
Annélides (Annelida)	<i>Caulleriella bioculata</i> (Keferstein, 1862)		2010
	<i>Lysidice hebes</i> (Verrill, 1900)		2007
	<i>Magelona mirabilis</i> (Johnston, 1865)		2020
	<i>Nephtys assimilis</i> Örsted, 1843		2015
	<i>Nephtys caeca</i> (Fabricius, 1780)		2010
	<i>Nephtys cirrosa</i> Ehlers, 1868		2020
	<i>Nephtys hombergii</i> Savigny in Lamarck, 1818		2016
	<i>Owenia fusiformis</i> Delle Chiaje, 1844		2020
	<i>Eulalia clavigera</i> (Audouin & Milne Edwards, 1833)		2019
	<i>Sigalion mathildae</i> Audouin & Milne Edwards in Cuvier, 1830		2020
	<i>Aonides oxycephala</i> (Sars, 1862)		2014
	<i>Scolelepis squamata</i> (Müller, 1806)		2020
	<i>Scolelepis tridentata</i> (Southern, 1914)		2018
	<i>Spiophanes bombyx</i> (Claparède, 1870)		2017
	<i>Lanice conchilega</i> (Pallas, 1766)		2019
Cnidaires (Cnidaria)	<i>Actinia equina</i> (Linnaeus, 1758)		2019
	<i>Actinia fragacea</i> Tugwell, 1856		2019
	<i>Anemonia viridis</i> (Forsskål, 1775)		2019
	<i>Aulactinia verrucosa</i> (Pennant, 1777)		2019
Crustacés (Crustacea)	<i>Aora gracilis</i> (Spence Bate, 1857)		2009
	<i>Nototropis guttatus</i> Costa, 1853		2022
	<i>Nototropis swammerdamei</i> (Milne Edwards, 1830)		2020
	<i>Bathyporeia elegans</i> Watkin, 1938		2014
	<i>Bathyporeia gracilis</i> Watkin, 1938		2018
	<i>Bathyporeia pelagica</i> (Spence Bate, 1856)		2022
	<i>Bathyporeia sarsi</i> Watkin, 1938		2018
	<i>Bodotria scorpioides</i> (Montagu, 1804)		2010
	<i>Cumopsis fagei</i> Băcescu, 1956		2020
	<i>Cumopsis goodsir</i> (Van Beneden, 1861)		2013
<i>Eocuma dollfusi</i> Calman, 1907		2014	

	<i>Apherusa bispinosa</i> (Spence Bate, 1857)		2007
	<i>Apherusa ovalipes</i> Norman & Scott, 1906		2007
	<i>Cancer pagurus</i> Linnaeus, 1758	Tourteau	2019
	<i>Phtisica marina</i> Slabber, 1769	Leptomère pédiaire	2021
	<i>Carcinus maenas</i> (Linnaeus, 1758)	Crabe enragé	2012
	<i>Portumnus latipes</i> (Pennant, 1777)	Étrille élégante	2020
	<i>Eurydice affinis</i> Hansen, 1905		2020
	<i>Eurydice naylori</i> Jones & Pierpoint, 1997		2020
	<i>Eurydice pulchra</i> Leach, 1815	Eurydice belle	2015
	<i>Echinogammarus marinus</i> (Leach, 1816)	Gammare marin	2008
	<i>Pachygrapsus marmoratus</i> (Fabricius, 1787)	Crabe marbré	2019
	<i>Haustorius arenarius</i> (Slabber, 1769)		2014
	<i>Idotea balthica</i> (Pallas, 1772)	Idotée tridentée	2012
	<i>Idotea emarginata</i> (Fabricius, 1793)		2012
	<i>Idotea pelagica</i> Leach, 1815		2010
	<i>Maja brachydactyla</i> Balss, 1922	Grande araignée de mer atlantique	2019
	<i>Gastrosaccus sanctus</i> (Van Beneden, 1861)		2020
	<i>Gammarella fucicola</i> (Leach, 1814)		2007
	<i>Pontocrates arenarius</i> (Spence Bate, 1858)		2020
	<i>Synchelidium maculatum</i> Stebbing, 1906		2012
	<i>Pilumnus hirtellus</i> (Linnaeus, 1760)	Crabe poilu rouge	2019
	<i>Pirimela denticulata</i> (Montagu, 1808)	Pirimèle denticulé	2019
	<i>Pollicipes pollicipes</i> (Gmelin, 1790)	Pouce-pied	2019
	<i>Liocarcinus marmoreus</i> (Leach, 1814)	Portune marbré	2019
	<i>Liocarcinus navigator</i> (Herbst, 1794)	Étrille arquée	2019
	<i>Necora puber</i> (Linnaeus, 1767)	Etrille de sable	2019
	<i>Pisidia longicornis</i> (Linnaeus, 1767)	Crabe porcelaine	2019
	<i>Porcellana platycheles</i> (Pennant, 1777)	Porcelaine grise	2019
	<i>Lekanesphaera rugicauda</i> (Leach, 1814)		2012
	<i>Lekanesphaera teissieri</i> (Bocquet & Lejuez, 1967)		2018
	<i>Xantho hydrophilus</i> (Herbst, 1790)	Crabe de pierre	2019
Echinodermes (Echinodermata)	<i>Amphipholis squamata</i> (Delle Chiaje, 1828)		2019
	<i>Marthasterias glacialis</i> (Linnaeus, 1758)		2019
	<i>Asterias rubens</i> Johnston, 1836		2019
	<i>Ophiothrix fragilis</i> (Abildgaard in O.F. Müller, 1789)	Ophiure fragile	2019
	<i>Psammechinus miliaris</i> (P.L.S. Müller, 1771)		2019
Mollusques (Mollusca)	<i>Aeolidia papillosa</i> auct. non (Linnaeus, 1760)		2012
	<i>Aplysia fasciata</i> Poiret, 1789		2012
	<i>Barleeia unifasciata</i> (Montagu, 1803)		2019
	<i>Donax trunculus</i> Linnaeus, 1758	Flion tronqué	2020
	<i>Donax vittatus</i> (da Costa, 1778)	Donace des canards	2020
	<i>Doris verrucosa</i> Linnaeus, 1758		2019
	<i>Littorina littorea</i> (Linnaeus, 1758)		2019

	<i>Littorina obtusata</i> (Linnaeus, 1758)		2019
	<i>Littorina saxatilis</i> (Olivi, 1792)		2019
	<i>Melarhaphé neritoides</i> (Linnaeus, 1758)	Sentinelle des rochers	2019
	<i>Nucella lapillus</i> (Linnaeus, 1758)	Pourpre petite pierre	2019
	<i>Ocenebra erinacea</i> (Linnaeus, 1758)		2019
	<i>Mytilus edulis</i> Linnaeus, 1758		2019
	<i>Tritia incrassata</i> (Strøm, 1768)		2019
	<i>Tritia pygmaea</i> (Lamarck, 1822)		2019
	<i>Onchidella celtica</i> (Cuvier, 1817)	Thalassolimace de Cuvier	2019
	<i>Ostrea edulis</i> Linnaeus, 1758	Huître plate	2012
	<i>Patella depressa</i> Pennant, 1777		2012
	<i>Patella vulgata</i> Linnaeus, 1758		2012
	<i>Elysia viridis</i> (Montagu, 1804)		2019
	<i>Rissoa parva</i> (da Costa, 1778)		2019
	<i>Macomangulus tenuis</i> (da Costa, 1778)	Telline-papillon	2019
	<i>Trivia monacha</i> (da Costa, 1778)	Grain de café à trois points	2019
	<i>Gibbula cineraria</i> (Linnaeus, 1758)		2012
	<i>Gibbula pennanti</i> (Philippi, 1846)		2012
	<i>Phorcus lineatus</i> (da Costa, 1778)		2019
	<i>Steromphala cineraria</i> (Linnaeus, 1758)		2019
	<i>Steromphala pennanti</i> (Philippi, 1846)		2019
	<i>Steromphala umbilicalis</i> (da Costa, 1778)		2019
Némertiens (Nemertea)	<i>Lineus longissimus</i> (Gunnerus, 1770)		2019
Poissons marins (Actinopterygii)	<i>Coryphoblennius galerita</i> (Linnaeus, 1758)	Blennie coiffée	2019
	<i>Lipophrys pholis</i> (Linnaeus, 1758)	Blennie mordocet	2019
	<i>Ciliata mustela</i> (Linnaeus, 1758)	Motelle à cinq barbillons	2019
	<i>Nerophis lumbriciformis</i> (Jenyns, 1835)	Nérophis lombricoïde	2019
Porifères (Porifera)	<i>Halichondria panicea</i> (Pallas, 1766)		2019
	<i>Hymeniacidon perleve</i> (Montagu, 1814)		2019
Urochordés (Urochordata)	<i>Botryllus schlosseri</i> (Pallas, 1766)	Botrylle étoilé	2019
Espèces introduites			
Invasive avérée	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Huître creuse	2019

Obs. : dernière observation de l'espèce sur le site

Annexe 15 – Liste des amphibiens et reptiles recensés sur le site

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DH FF	LR UE	LR Fr	P. nat.	ZNI EFF	LR Bzh	RB Bzh	Obs.
Amphibiens										
Modéré	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte		LC	NT	x	x	LC	1	2023
	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Triton marbré		LC	NT	x	x	LC	2	2008
	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Alyte accoucheur		LC	LC	x	x	NT	1	2008
	<i>Epidalea calamita</i> (Laurenti, 1768)	Crapaud calamite		LC	LC	x	x	NT	1	2023
	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Pélodyte ponctué		LC	LC	x	x	NT	1	2023
	<i>Bufo spinosus</i> (Daudin, 1803)	Crapaud épineux		LC*	NE	x		LC*	3	2023
	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Grenouille verte		NE	NT	x		DD	1	2023
	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Grenouille rousse		LC	LC	x		NT	1	2022
	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile		LC	LC	x		LC	1	2022
	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Triton palmé		LC	LC	x		LC	1	2019
	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Salamandre tachetée		LC	LC	x		LC	1	2011
Reptiles										
Fort	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade		LC	VU	x	x	EN	4	2023
	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Coronelle lisse		LC	LC	x	x	DD	1	2022
	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles		LC	LC	x	x	DD	1	2022
	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Orvet fragile		LC	LC	x		LC	1	2023
	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Lézard à deux raies		LC	LC	x		LC	1	2023
	<i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789)	Couleuvre helvétique		LC	LC	x		LC	1	2023

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : liste rouge européenne (2009)

LR Fr : liste rouge française des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (2015)

P. nat. : liste des espèces protégées en France (2021)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des odonates de Bretagne (2015)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2017)

Obs. : dernière observation de l'espèce sur le site

*Inscrit sous le nom de *Bufo bufo*

Annexe 16 – Liste des mammifères recensés sur le site

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DH FF	LR UE	LR Fr	P. nat.	ZNI EFF	LR Bzh	RB Bzh	Ind loc.	Obs.
Mammifères terrestres											
Majeur	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Campagnol amphibie		VU	NT	x	x	NT	3	1,2	2010
Très fort	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	x	NT	LC	x	x	LC	3	1,3	2018
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand Rhinolophe	x	NT	LC	x	x	EN	4	1,6	2020
Modéré	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne		NT	NT			NT	2	1	2019
	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius		LC	NT	x		NT	2	2,6	2013
	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe		LC	NT		x	DD	1	1,1	2018
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune		LC	NT	x		LC	1	1	2013
	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Murin à moustaches		LC	LC	x	x	LC	1	1,7	1985
	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Écureuil roux		LC	LC	x	x	LC	1	1,1	2013
	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Crossope aquatique		LC	LC	x	x	DD	1	2,1	2023
	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Lièvre d'Europe		LC	LC		x	LC	1	1	2019
	<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	Rat des moissons		LC	LC		x	DD	1	1,3	2001
	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton		LC	LC	x		LC	1	1,2	2013
	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl		LC	LC	x		LC	1	1,3	2013
	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Hérisson d'Europe		LC	LC	x		LC	1	1	2009
	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rat noir		LC	LC			DD	1	8,3	2014
	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre		LC	LC			LC	1	1,1	2012
	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuril européen		LC	LC			LC	1	1	2023
	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen		LC	LC			LC	1	1	2023
	<i>Microtus subterraneus</i> (de Sélys-Longchamps, 1836)	Campagnol souterrain		LC	LC			LC	2	1,3	2001
	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Belette d'Europe		LC	LC			LC	1	1,1	2023
	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe		LC	LC			LC	1	1	2019
	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	Crocidure musette		LC	LC			LC	1	1,1	2022
<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux		LC	LC			LC	1	1	2017	
Mammifères marins											
Très fort	<i>Halichoerus grypus</i> (Fabricius, 1791)	Phoque gris	x	LC	NT	x	x	VU	4	-	2022
	<i>Physeter macrocephalus</i> Linnaeus, 1758	Cachalot								-	2016
	<i>Stenella coeruleoalba</i> (Meyen, 1833)	Dauphin bleu et blanc								-	2017

	<i>Delphinus delphis</i> Linnaeus, 1758	Dauphin commun									-	2015
	<i>Globicephala melas</i> (Traill, 1809)	Globicéphale noir									-	2020
	<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)	Grand dauphin commun									-	2021
	<i>Phocoena phocoena</i> (Linnaeus, 1758)	Marsouin commun									-	2021
	<i>Phoca vitulina</i> Linnaeus, 1758	Phoque veau-marin									-	2020
	<i>Balaenoptera physalus</i> (Linnaeus, 1758)	Rorqual commun									-	2022
Espèces introduites												
EEE	<i>Mustela vison</i> Schreber, 1777	Vison d'Amérique										2019
	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Ragondin										2023
	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Rat musqué										2023

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce / « EEE » : espèce exotique envahissante

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : liste rouge européenne (2007)

LR Fr : liste rouge française des mammifères de France métropolitaine (2017)

Prot nat. : liste des mammifères terrestre protégés en France (2007)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des mammifères de Bretagne (2015)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2017)

Ind loc. : Indice de localité (nombre de mailles bretonnes / nombre de mailles occupées dans le grand-Ouest), Atlas des mammifères de Bretagne (2015)

Obs. : dernière observation de l'espèce sur le site

Annexe 17 – Liste des poissons recensés sur le site

Enjeu	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DH FF	LR UE	LR Fr	P. nat	LR Bzh	ZNI EFF	RB Bzh	Obs.
Poissons d'eau douce et migrateurs										
Majeur	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguille d'Europe		CR	CR		CR	x	4	2023
Fort	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Brochet		LC	VU	x	NT	x	3	2023
Modéré	<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	Truite fario	x	LC	LC		LC	x	4	2023
	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	Carpe commune		VU	LC		LC		1	2023
	<i>Platichthys flesus</i> (Linnaeus, 1758)	Flet d'Europe		LC	DD		DD	x	4	2023
	<i>Leucaspis delineatus</i> (Heckel, 1843)	Able de Heckel		LC						2023
	<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	Perche		LC	LC		LC		1	2023
	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	Gardon		LC	LC		LC		1	2023
	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Rotengle		LC	LC		LC		1	2023
	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	Tanche		LC	LC				1	2023

Poissons marins										
	<i>Coryphoblennius galerita</i> (Linnaeus, 1758)	Blennie coiffée		LC						2019
	<i>Nerophis lumbriciformis</i> (Jenyns, 1835)	Nérophis lombricoïde		LC						2019
	<i>Ciliata mustela</i> (Linnaeus, 1758)	Motelle à cinq barbillons		LC						2019
	<i>Lipophrys pholis</i> (Linnaeus, 1758)	Blennie mordocet		LC						2019
Espèces introduites										
	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	Truite arc-en-ciel								2023
	<i>Gambusia holbrooki</i> Girard [ex Agassiz], 1859	Gambusie								2025

Enjeu : résultat de l'évaluation de la patrimonialité de l'espèce / EEE : espèce exotique envahissante

DHFF : Espèce inscrite à l'annexe 2 de la Directive « Habitats, faune, flore » (1992)

LR UE : liste rouge européenne (2011)

LR Fr : liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2019)

Prot nat. : liste des poissons d'eau douce protégés en France (2007)

ZNIEFF : espèces déterminantes ZNIEFF pour la Bretagne

LR Bzh : Liste rouge des poissons d'eau douce de Bretagne (2017)

RB Bzh : Responsabilité biologique régionale (2015)

Obs. : dernière observation de l'espèce sur le site